

12

[O] Chinese

Vol XII

V. 21 - V. 22

卷之四

南沙席世臣郭客校

長洲張璐路玉衡義
南沙席世臣鄂容校

消渴淋閉方 凡四類

消渴第一 論六首 方五十三首

論曰凡積久飲酒未有不咸消渴然則大寒凝海而酒不凍明其酒性酷熱物無以加肺火鹽鹹酒客耽嗜不離其口三觴之後制不由己飲噉無度咀嚼鮮醬不擇酸醃積年長夜酣興不醉遂使三焦猛熱五臟乾燥木石猶且焦枯在人何能不渴治之愈否屬在病者若能如方節慎旬月可瘳不自愛惜厄不從踵方書醫藥實多有效其如不慎者何其所慎有三一飲酒二房室三鹹食及麵能慎此者雖不服藥而自可無他不如此者縱有金丹亦不可救深思慎之又曰消渴之人愈與未愈常須慮有大難何者消渴之人必於大骨節間發癰疽而卒所以戒之在大難也當預備癰藥以防之有人病渴利始發於春經一夏服括萆根鼓汁得其力渴漸瘳然小便猶數甚晝夜二十餘行常至三四升極瘳不減二升也轉久便止漸食肥膩日就羸瘦咽硬唇口焦燥吸吸少氣不得多語心煩熱兩脚痠食乃兼倍於常而不為氣力者當知此病皆由虛熱所致治法可常服括萆汁以降熱牛乳杏酪善於補此法最有益

治消渴除腸胃熱實方

麥門冬 茯苓

黃連 石膏

葳蕤 各八分

人參 龍膽

黃芩 各六分

升麻 四分

分枳實五分 生薑屑

枸杞子 外臺用

括萆根 各十

右十三味為末

蜜丸如梧子大

以苧根一升

粟米

三合煮汁服十九日

二若渴則與此飲

大麻亦得

○又方

括萆根

生薑 各五

生麥冬汁 蘆根 各

升苧根 各三

右五味咀咀以水一斗煮取三升分為三服

衍義

消瘴有上中下之分究其源總由腎氣式微不能蒸發津氣於上所以燥渴不止內經雖有昂

消肺消熱中消中消瘴脾瘴肺藏寒熱相移之不同靡不因陰虛不能制陽所致所以金匱首推腎氣丸主治消渴小便反多即內經心移寒於肺肺消飲一澁二亦是君火失政陰火憑厥肺金總有客熱

貪水下焦真陽失守而漫便反多其火則五苓散以導熱滋乾并取文蛤之鹹寒以治渴欲飲水不止三方為消渴之扼要千金深入長沙之堂得金匱肯綮雖能取法乎上效用附桂而廣鹿茸羊腎加減腎泄湯等治必竟秦地水土剛強所患多實少虛所以確遵內維熱中消中不可服芳草石藥之禁而用清熱滋津信手合轍如此方之用麥門冬葳蕤以滋上燥黃芩黃連以清實熱石膏括蕤以治燥渴人參茯苓以滋津氣升麻以升清陽龍膽以降濕熱枸杞除熱中消渴枳實泄上下諸氣生薑通固結之津服用茅根粳米清胃止渴兼能壓丹石毒全以解熱為務詳本方枸杞用子以滋胃家耗散之津外臺用根以清三焦鬱蒸之火活法在人不必固執而又方用麥門冬三根俱清熱滋燥之品兼取生薑通行津液而渴自止矣

茯神湯

洩熱止渴治胃腑實熱引飲常渴方

茯神

二兩升臺

知母

四兩

葳蕤根

生麥冬 略五生地黃六兩小麥二升淡竹葉三升太棗十

右九味

咬咀以水三斗煮小麥竹葉取九升去

滓下藥者取四升分四服不論早晚若渴即進非但止治胃渴通治渴患熱者

衍義

方中滋培氣血清火安神之味專取小麥大棗調肝氣運脾津以治胃肺之標熱

猪肚丸

治消渴方

猪肚如饅治黃連

梁米

略五

括蕤根

茯神

略四

知母

三兩

六味為末

內猪肚中縫塞安飯中蒸極爛乘熱入藥臼中搗可丸如硬加蜜和丸如梧子大飲服二十

丸日三〇又方

黃芪

茯神

括蕤根

甘草

麥冬

略三

乾地黃

五兩

右六味

咬咀以水八升

煮取二升半去滓分三服日進一劑服十劑佳

浮萍丸

治消渴方

乾浮萍

括蕤根等分

右二味

為末以人乳和丸如梧子大空腹飲服二十九

日三三年病者三日愈治虛熱大佳

衍義

本經言浮萍下水氣止消渴以其能開發腠理通行經脈也前方以衛氣不固津隨汗泄而渴

故用黃芪此方以肺氣固結津不行而渴故用水萍兼取括蕤根協濟以建清熱止渴之功

治消渴日飲水一石者方 鉛丹二兩 附子一兩 葛根 括萆根略三 右四味為末蜜丸如梧子飲服

十九日三渴則服之春夏減附子

衍義

鉛丹鎮攝濁陰附子開通陰結葛根宣導脾津括萆根清解熱渴標本兼該之治此方得之

黃連丸

治渴方 黃連 生地黃各一斤張文仲云十斤 右二味絞地黃汁清黃連出曝燥復內汁中令汁盡

曝燥乾為末蜜丸如梧子服二十九日三食前後無拘亦可為散以酒服方寸匕

衍義

黃連清燥膈上之熱生地滋培下焦之陰畢竟苦寒傷中病即止不必盡劑

括萆粉

治大渴祕方 深掘一大括萆根厚削去皮至白處止寸切水浸一日一夜易水經五日取出

爛搗碎研之以袋濾如出粉法乾之水服方寸七日三四亦可作粥乳酪中食之不限多少瘥止○又

方括萆粉和雞子曝乾更搗為末水服方寸七日三九服亦可○又方 水和括萆根為末水和服方

寸七亦可蜜丸如梧子大服三十丸○又方 濃煮竹根汁飲之瘥止○又方 漬豉汁任性多少飲

之 又方 以青梁米煮取汁飲之以瘥止

衍義

括萆根本經首言治消渴身熱煩滿澹粉者粥作散為丸無不宜之 竹根清心解煩

香豉汁除煩解毒

青梁米解酒生津與梁米不殊或云即青菰米功專止渴解煩總皆清胃之

品

論曰夫內消之為病當由熱中所致小便多於所飲令人虛極短氣夫內消者食物皆消作小便又不渴

正觀十年梓州刺史李玄博先服白石英既久忽房道強盛經月餘漸患渴經數日小便大日利夜百行

百方治之漸以增劇四體羸瘦不能起止精神恍惚口舌焦乾而卒此病雖稀甚可畏也利時六脈沉細

微弱服枸杞湯即效但不能長愈服鉛丹散亦即減其間將服除熱宣補丸

枸杞湯

治渴而利者方 枸杞枝葉一斤 黃連 括萆根 甘草 石膏各三兩 右五味咀咀以水一

斗煮取三升分五服日三夜二劑者多合渴即飲之

鉛丹散

治消渴止小便數兼消中方

鉛丹 胡粉 甘草 澤瀉 石膏 括蕞根 赤石脂 白

石脂

右八味各五分治下

節水服方寸七日三壯人服七半一年病者一日愈二年病者二日

愈渴甚者夜二服腹痛者減之九服亦佳每服十九傷多令人腹痛

張文仲云腹中痛者以漿水下之

古今錄驗云服此藥了經三兩日宜燭煮羊用肚空腹服之或作羹亦得宜常

淡食之候令小便數鹹苦即宜從容九兼者散將息方見外臺第十一卷中

附義

杞根專瀉三焦氣分之火火在上者枝葉尤宜黃連瀉心下實熱括蕞治肺胃燥渴甘草解毒

安中石膏清胃止渴兼解石藥之悍

鉛丹胡粉赤白石脂鎮攝痰涎分走血氣石膏解石藥毒甘草

解毒草藥毒括蕞專主消渴澤瀉瀉兼治水逆二方總解熱毒一解上熱一化下毒然病真則藥假神丹不

能起髑髏也

扶神丸方

治腎消渴小便數者扶神

黃芪 人參 麥冬 甘草 黃連 知母 括蕞根

子三合 茯苓 乾地黄 石膏

服三十九日二服漸加至五十九

酸棗丸

治口乾燥內消方

酸棗 五合 酸安石榴子 五合 覆盆子 葛根 三

冬四兩 石蜜 細兩 桂心 六銖 烏梅 十枚

右十味為末蜜丸口含化不限晝夜以口中有津液為度服

盡復取含無忌

附義

扶神丸中安神益氣清熱解渴瀉陰火泄腎邪滋肺胃清心脾乃真陰虧損三焦燔虐宣中需

補之劑故集驗因以命方云治腎消者主下焦熱能消水珠非腎臟本虛之謂

酸棗丸中專以酸收

為主惟取桂通陽氣萬行津液石蜜溫脾茯苓安胃麥門冬滋肺括蕞根止渴覆盆子助陽亦能收斂

精血也

治消中日夜尿七八升者方

用鹿角炙令焦為末以酒服五分七日漸加至方寸七〇又方

葵根如

五升盆大雨東以水五斗煮取三斗宿不食平旦一服三升〇又方

遍麻汁服一升佳

葵根如

五升盆大雨東以水五斗煮取三斗宿不食平旦一服三升〇又方

遍麻汁服一升佳

葵根如

五升盆大雨東以水五斗煮取三斗宿不食平旦一服三升〇又方

遍麻汁服一升佳

葵根如

五升盆大雨東以水五斗煮取三斗宿不食平旦一服三升〇又方

治消中... 鹿角補腎強陰... 葵根寒滑利竅一瀉麻水散血通津... 三方一飲陽精一利津竅一清胃熱

衍義 鹿角補腎強陰 葵根寒滑利竅一瀉麻水散血通津 三方一飲陽精一利津竅一清胃熱 各有所宜

論曰強中之病甚長興盛不交津液自出也消渴之後即作癰疽皆由石熱凡如此等宜服猪腎薺尾湯制腎中石熱也又宜服白鴨通湯方見後二十六卷解石毒屬中

猪腎薺尾湯方 猪腎一具大豆一升薺尾人參石膏略三枚神一磁石綿裹知母 葛根 括

蕞根 黃芩 甘草略二 右十二味咬咀以水一斗五升先煮猪腎大豆取一斗去滓下藥煮取三

升分三服渴即飲之下焦熱者夜輒合一劑病勢漸歇即止

衍義 石藥之悍雖流布中外其毒必伏匿少陰經中所以借水獸之腎引領薺尾專主強中之味與磁石知母黑大豆同入腎經佐以石膏黃芩葛根甘草括蕞根輔佐薺尾分解內外之毒製劑雖專不得人參陽藥助胃以行其力則毒匿幽深何由發越就謂人參壅補熱邪而致扼腕耶

增損腎泄湯 治腎氣不足消渴小便多腰痛方 羊腎一具遠志人參澤瀉桂心當歸 茯苓龍骨乾地黃黃芩甘草 芍藥略二麥門冬一升五味子半升生薑六兩太棗二十枚 右

十六味以水一斗五升先煮羊腎取一斗二升次下諸藥取三升分三服

衍義 增損腎泄湯有三一見腳氣一見腎臟皆主邪痺肥中阻滯氣化小便滴瀝不通此治消渴小便多亦用之者總取通調氣化使之無過不及之患較腎臟門方則少石斛桑皮括蕞根較肺氣門中則少磁石石脂防風黃芩半夏芍藥括蕞根而加黃芩澤瀉此證小便雖多必頻數澀滯故取二味為清熱利水嚮導專類羊腎引入腎臟與前方用猪腎之意不殊

治下焦虛熱上注脾胃從脾胃上注於肺好渴利方 竹葉剉三甘草三兩括蕞根生薑略五麥門冬

茯苓略四太棗三小麥地骨皮略一 右九味咬咀先以水三斗煮小麥取一斗去滓澄清取八

升去上沫取七升煮藥取三升為三服

衍義 下利而渴燥熱無疑故用地骨皮治下焦熱甘草小麥治中焦熱竹葉括蕒根治上焦熱茯苓
門冬交通上下生薑大棗運行脾津為道熱之宣使

治渴利虛引飲不止消熱止渴方 竹葉^{一作}地骨皮^{一作}生地黄^{一作}生麥冬^{一作}括蕒根^{一作}石膏^{一作}

分扶神^{一作}茯苓^{一作}減^{一作}知母^{一作}生薑^{一作}太棗^{一作}右十一味以水一斗二升煮取四升分四服

衍義 此以地黃地骨治下焦熱石膏知母治中焦熱竹葉括蕒根治上焦熱茯苓麥冬咸澀交通上

下生薑大棗運行脾津為道熱之宣使前以中氣不死故用甘草小麥此以膈上蘊熱故用石膏知母
不得不少為變通

地黃丸 治面黃手足黃咽中乾燥短氣脈如連珠除熱止渴利補養方 生地黄汁^{各二} 生括蕒汁^{各二}

生羊脂^{三升} 白蜜^{四升} 黃連^{為料} 右五味合煎令可丸如梧子大飲服五九日二加至二十九若苦

冷而渴渴瘥即宜別服溫藥

衍義 脈如連珠心脾結熱可知故用黃連專瀉二經之積熱地黃滋血括蕒根滋津牛羊脂蜂蜜滋

腸胃之枯燥也

治渴小便數方 貝母^{六分} 茯苓^{一作}括蕒根^{一作}鉛丹^{一分} 雞臍^中黃皮^{十四} 右五味治下飢飲

服方寸七日三瘥後常服佳常服不絕則去鉛丹以蜜丸之用麥飲下

衍義 此以陰火鼓激濁陰壅塞清陽而致燥渴故用鉛丹鎮攝於下貝母開發於上括蕒根清利於

中茯苓通調氣化引領雞臍脰消積利竅使熱隨溲洩而渴自治矣

治渴利方 用生括蕒根三十斤切以水一石煮取一斗半去滓以羊脂五合煎取水盡以溫酒先食服

如雞子大日三

治渴小便利復非淋者方 用榆白皮二斤切以水一斗煮取五升每服三合日三〇又方 小豆霍一

把搗汁頓服三升〇又方 取薔薇根水煎服之佳^{中後遺}〇又方 三年雷轟果燒末以飲服之

附後以治
中遺尿○又方 桃膠如彈丸大含之咽津○又方 蠟如雞子大以酢一升煮二沸適寒溫頓服之

衍義 括萆根專主熱中消渴煎用牛膝以助血氣服用溫酒以行藥力 榆白皮滑利小便 小豆
菴治膏粱積熱 萆薢根主消渴多尿 車龍巢散膀胱風氣 桃膠和血通津 蠟味至淡清胃解
毒得醋以飲逆上之氣

論曰凡人生聚恣者眾盛壯之時不自慎惜情縱慾極意房中漸至年長腎氣虛竭百病滋生又年少
懼不能房多服石散真氣既盡石氣孤立惟有虛耗唇口乾燥精液自泄或小便赤黃大便乾實或渴而
且利日夜一石或渴而不利或不渴而利所食之物悉化小便皆由房室不節所致也名為消渴但小便
利而不飲水者腎實也經云腎實則消消者不渴而利是也所以服石之人小便利者石性歸腎得石則
實實則能消水漿故利多則不能潤養五臟臟衰則生諸病張仲景云熱結下焦則為溺血亦令人淋
閉不通內有熱者則喜渴除熱止渴兼虛者須除熱補虛則瘥矣

治不渴而小便大利遂至於免者方 用牡蠣五兩以患人尿三升煮取二升分再服神驗

衍義 論中有云服石藥人小便利者石性歸腎腎得石則實故專用牡蠣之鹹寒走腎不特散結兼
能瀉精以療小便之無度服用患人尿者取為導引病氣之去路而石藥之毒亦得下降矣

治小便不禁日使一二斗或如血色方 麥冬 乾地黄各八兩 乾薑四兩 續斷 沙蔴藜子 桂心各三

甘草一兩 右七味以咀以水一斗煮取二升五合分三服消渴瘦細小便數

衍義 小便不禁非屬腎臟無陽即係膀胱積血昔人有云麥門冬以地黃為使服之令頭不白取其

添精滋血通腎氣也今與蔴藜續斷同用本經蔴藜條下首言治惡血則小便之過利不禁或如血色
為積血無疑以血為陰類故使小便反多乾薑桂心之陽藥既溫下焦虛寒并散膀胱虛熱一舉而兩
得之甘草調和寒熱性味先哲治腎虛風襲肝傷血結並用白蔴藜若固腎臟精氣則沙蔴藜者為勝所

以混舉不分隨機應用可也

九房散 治小便多或不禁方 兔絲子 蒲黃 黃連 三肉旋蓉二兩硝石一兩 右五味治下篩

并雞臍腔中黃皮三兩為散飲服方寸大如人行十里久更服日三翼方有五味子三兩空腹服

衍義 方中兔絲續絕傷補精氣蒲黃消瘀血止痛黃連瀉心火除積熱旋蓉助少火滋陰精硝石

通固結解石毒雞臍腔消積氣安腸胃能使更瀉有常妙用全在乎此

又方 鹿茸三寸桂心一尺附子三枚澤瀉 韭子 右六味治下篩以漿水服五分七

日三加至一錢七

衍義 鹿茸桂附皆大溫峻補之藥得韭子之濁味專助相火羊躑躅專搜經隧骨空中毒風澤瀉佐

之使風毒濁濕從水道開泄二味專為樂毒而設

黃芪湯 治消中虛勞少氣小便數方 黃芪 桂心 芍藥 當歸 甘草 生薑 黃芩 乾地

黃 麥冬 各一大棗三十 右十味以水一斗煮取三升分三服日三

衍義 虛勞少氣是宿病故用黃芪甘草歸芍地黃以資氣血消中小便數是新病故用黃芩麥冬桂

心薑棗以通津液

棘刺丸 治男子百病小便過多失精方 棘刺 石龍芮 巴戟天 厚朴 麥門冬 兔絲子

草解 外臺作 柏子仁 藏菟 小草 乾地黃 細辛 杜仲 牛膝 旋蓉 石斛 桂心 防葵

酪一烏頭半兩 右十九味為末蜜和更搗五六千杵丸如梧子大飲下十九日三加至三十九丸以知

為度

衍義 男子百病不獨指腎虛小便多而言本經棘刺主治與皂刺不甚相遠別錄治丈夫虛損陰痿

精自出統領巴戟旋蓉兔絲牛膝門冬地黃杜仲小草草解補腎益精功司開合足以充其所用至於

烏頭防葵石龍芮厚朴等味非有固結滯氣以及此再詳藏菟柏仁石斛細辛桂心通風利竅之治

則烏頭防葵石龍芮厚朴等藥可以默悟其微總在攻補百病之列也

治尿數而多者方 用羊肝一具作羹內少羊肉和鹽豉如食法任性食三具

衍義 腎司閉藏肝司疎泄令以肝氣失職不能司統攝之權故用羊肝以補肝臟之虛和鹽豉者借

以引入腎家也

治消渴胃反而吐食者方 茯苓八兩澤瀉四兩白朮 桂心 生薑各三兩甘草二兩 右六味㕮咀以

水一斗煮小麥三升取汁三升去滓下藥煮取二升半每服八合日二

衍義 五苓散治水逆而渴此兼胃反嘔逆故去猪苓而易甘草以和胃氣生薑以止嘔逆先煮小麥

汁煎服者助肝氣之生發也

又方 取屋上瓦三十年者碎如雀腦三升東流水二石煮二斗內藥如左方 白朮 乾地黄 生薑

人參 橘皮 甘草 黃芪 遠志 桂心 當歸 芍藥各二兩大棗三十 右十二味㕮咀內瓦汁

中煮取三升分四服或單飲瓦汁亦佳

衍義 於黃芪建中方內加參朮以助脾胃之氣歸地以資肝腎之血橘皮遠志清中利竅并取陳年

瓦礫受日月之光華雨露之濡澤而流行有節用以煮汁煎藥助諸藥清熱利水之功也

治熱病後虛熱渴四肢煩疼方 葛根一斤人參 甘草各一兩 右四味㕮咀以水一斗五升

煮取五升渴即飲之日三夜二

衍義 人參甘草資助通調之力葛根流行阻遏之津竹葉清解膈上之火則病後虛熱悉從水道疎

泄而虛熱口渴四肢反疼不治而治矣

骨填煎 治虛勞渴無不效方 茯苓 兔絲子 當歸 山茱萸 牛膝 五味子 附子 巴戟天

石膏 麥冬各三兩 石葦 人參 茯苓外臺作 桂心各四兩 大豆卷一升天冬五兩 右十六味為末次

取生地黃括蔓根各十斤搗絞取汁於微火上煎減半便作數分內藥并下白蜜三斤生薑一斤微火

煎令如糜食如雞子黃大日三亦可飲服之

衍義 方中益氣資精清熱利水諸品專藥生髓補中填骨髓之功故云骨填煎云

茯神散 治虛熱四肢羸之渴熱不止消渴補虛方 茯神 茯苓 威靈 四生石斛 黃連 各八括

萸根 丹參 各五甘草 五味子 知母 當歸 人參 各三麥藥 作小麥 右十三味為末以絹

袋盛三方寸七水三升煮取一升日二服一作一服

衍義 三焦之治與腎臟之治截然兩途腎臟陰虛而用壯水之劑不得雜以補氣之味恐其留戀陰

藥於上泥膈奪食轉增滿漫非若益火消陰宜兼補氣以資陽生陰長之功也三焦本屬相火所以用

茯苓五味知母滋培下焦黃連麥藥石斛清理中焦茯神威靈括萸滋養上焦又須人參甘草匡扶胃

氣當歸丹參調和營血則三焦之火得以涵養而無歎起之患矣

枸杞湯 治虛勞口中苦渴骨節煩熱或寒者方 枸杞根 切 麥門冬 三升 小麥 三升 右三味以

水二斗煮麥熟藥成去滓每服一升日再

衍義 枸杞清熱門冬滋津專賴小麥鼓舞生陽之氣

巴郡太守奏三黃丸 治男子五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱者方 春三月黃芩 四兩

大黃 三兩 黃連 四兩 夏三月黃芩 六兩 大黃 一兩 黃連 七兩 秋三月黃芩 六兩 大黃 二兩 黃連 三兩 冬

三月黃芩 三兩 大黃 五兩 黃連 二兩 右三味隨時加減和搗以蜜為丸如大豆飲服五九日三不知

稍加至七丸取下而已一月病愈久服走逆奔馬常試有驗 一本云云 三月不

衍義 巴蜀風土剛厚民多血氣剛強雖有勞傷消渴肌肉不生多屬水虧火旺故巴郡所奏之方專

取伊尹三黃隨四序而為加減在春陽氣方強之時雖當寒折祇宜平調以分解之夏月陰氣在內經

有濕熱僅堪以苦燥之入秋燥令司權熱邪傷表居多故取輕劑以外泄之嚴冬陽氣潛藏熱邪內伏

專事苦寒以內奪之藥雖峻削日服無幾可無傷中之慮婦人濕熱帶下亦不出此久服走逆奔馬者

濕熱去而筋經踴捷也然須諒人元氣而施若津枯血燥慎勿誤投以取虛乏之咎

治熱渴頭痛壯熱及婦人血氣上衝悶不堪者方 茅根三升切三搗取汁全盡渴即飲之

衍義 熱渴頭痛壯熱胃熱上蒸無疑故專取茅根一味清熱利水為務

治嶺南山瘴風熱毒氣入腎中變寒熱胸弱虛滿而渴方 黃連五兩生括萆根搗汁生地黃汁羊乳汁

右四味以三升和黃連末為丸空腹飲服三十九如梧子大漸加至四十九日三重病五日瘥輕者三

日瘥無羊乳牛乳人乳亦得若藥苦難服即煮小麥粥飲服之主虛熱

衍義 瘡瘡濕熱乘虛襲入故用黃連清燥為主兼括萆根滋津生地黃滋血羊乳兼滋津血以和黃

連之燥

阿膠湯 治虛熱小便利而多服石散人虛熱當風取冷患胸氣喜發動兼消渴腎脈細弱方 阿膠

二挺麻子一升附子一枚乾薑二兩遠志四兩 右五味為末以水七升煮取二升半去滓內膠令烊

分三服說云小便利多白日夜數十行至一石頓服五日良

衍義 小便清利而渴兩尺脈細而弱真陽失職於下石散毒發於上故用薑附以救下虛遠志以利

腎竅阿膠以滋陰血麻仁以潤脾津并解石散之毒也

灸法

論曰凡消渴病經百日以上不得灸刺灸刺則於瘡上漏膿水不歇逆至癰疽羸瘦而死亦忌有所誤傷

但作鍼許大瘡所飲之水皆於瘡中變成膿水而出若水出不止必死慎之慎之初得患者可如方灸刺

之 治消渴咽乾灸胃脘下脘三穴各百壯穴在背第八椎下橫三寸

口乾不可忍者灸小腸膈百壯橫三寸間灸之 消渴口乾煩悶灸足厥陰百壯

又灸陽池五十壯 治消渴

消渴咳嗽灸手厥陰隨年壯 消渴小便數灸兩手小指頭及兩足小趾頭并灸項椎

又灸當脊梁中 央解間一處與腰目上兩處凡三處 又灸背上腺膈下四寸當夾脊梁兩處凡諸灸皆當隨年壯 又

灸腎臑二處 又灸腰目在腎臑下三寸亦俠脊骨兩傍各一寸半 左右以指按取關元一處又兩傍

各二寸二處 又陰市二處在膝上當伏兔上行三寸臨膝取之或三二列灸相去一寸名曰腎系者

經云伏兔曲泉陰谷陰陵泉復留此諸穴斷小便最佳不損陽氣又云止遺溺也大略中封然谷太白大

都跌陽行間大敦隱白涌泉凡此諸穴各一百壯腹背兩脚凡四十七處其腎臑腰目關元水道此可灸

三十壯五日一報各得一百五十壯佳涌泉一處可灸十壯大敦隱白行間三處可灸三壯餘悉七壯皆

五日一報滿三灸可止也若發灸諸陰諸陽在脚表并灸肺臑募按流注孔穴壯數如灸陰家法 小便

數而少且難用力輒失精者令其人舒兩手合掌併兩大指令齊急逼之令兩爪甲相近以一炷灸兩爪

甲本肉際內際方後自然有角令炷當角中小侵入爪上此兩指共用一炷也 亦灸脚大趾與手同法

各三炷而已經三日又灸之

淋閉第二論一首 方四十九首 灸法十五首

論曰熱結中焦則為堅下焦則為溺血令人淋閉不通此多是虛損人服大散下焦客熱所為亦有自然

下焦熱者但自少可善候之凡氣淋之為病溺難澀常有餘滯石淋之為病莖中痛溺不得卒出膏淋之

為病尿似膏自出勞淋之為病勞倦即發痛引氣衝下熱淋之為病熱即發甚則尿血治之皆與氣淋同

凡人候鼻頭色黃者小便難也

地膚子湯 治下焦濕熱小便赤黃不利數起出少莖痛或血出溫病後餘熱及霍亂後當風取熱過度

飲酒房勞及行步冒熱冷飲逆熱熱結下焦及散石熱動關格小腹堅胞脹如斗有此諸淋悉治之立

驗方 地膚子 知母 黃芩 猪苓 瞿麥 枳實 松實 升麻 通草 葵子 海藻 右十
味為末以水一斗煮取三升分三服大小便皆閉者加大黃三兩女人房勞腎中有熱小便難不利小
腹滿痛尿沉細者加猪腎一具崔氏云若加腎可用水一斗五升先煮腎
取一斗汁內藥煎之小品方不用枳實
行藏 地膚子本經主膀胱熱利小便便千金治熱淋以之為君佐以知母黃芩猪苓瞿麥通草葵子海

藥等味種種皆清熱利竅之品惟枳實升麻一破痰積一分清濁清濁分而氣無阻滯痰積破而津液宣通焉有熱結淋閉之患乎方後大小便皆開用大黃可悟枳實為大黃前導之義腎中有熱加猪腎用為腎臟逆熱之內應也

治百種淋寒淋熱淋勞淋小便澀胞中滿腹急痛方 通草 石葦 甘草 王不留行略二冬葵子

滑石 瞿麥 白朮 芍藥略三 右九味咬咀以水一斗煮取三升分三服治下熱以麥粥清服方

時記○又方 滑石 石葦 括蕞根略二 右三味治下節大麥飲服方寸七日三

衍義 方中諸味皆清熱利竅之品獨白朮芍藥一主實脾利水一主和血通津人但知芍藥酸收之

用不知本經原有利小便益氣之功所以建中湯四逆散真武湯用之但知白朮為壅補之味不知本

經原有除熱消食之治所以枳朮湯理中丸五苓散用之然用以清熱利水皆不經火炒火炒則滯而

不通矣 又方 三味寒滑通津專司疎泄之品故取大麥以和胃氣化積滯也

治諸種淋方 葵子八兩茅根 石首魚頭石略三甘草一兩 通草二兩貝子五合天麻根五兩 右七

味為末以水一斗二升煮取五升分五服日三夜二亦主石淋○又方 榆皮 車前子 冬瓜子

各一鯉魚齒 桃膠 通草 地脈略二 瞿麥四兩 右八味咬咀以水一斗煮取三升分三服日三

又方 細白沙三升熬令極熱以酒三升淋取汁服一合

衍義 方中葵根白茅根滑 通津通草甘草利竅瀉火石首貝子真堅利水天麻根辛溫陽藥性專

祛風先哲有口乾便秘者不可誤投之禁當是天明精之誤天明精甘寒化熱本經有瘀血血瘀下血

欲死下血止血利小便之治其治血瘀利小便正與石首貝子真堅利水治石淋之用相符不敢擅為

改易聊陳管見以俟明哲裁度 鯉魚齒專治石淋冬瓜子利水解毒桃膠和血通津地脈通行血脈

瞿麥車前通草榆皮通熱利水藥也 白沙用酒熱淋以行清熱利水之力

治淋痛方 滑石四兩貝子略二 桃膠 白朮 通草 芍藥略二 右六味為末酒服方寸七日二服

十日瘥○又方

葵子五合茯苓白朮當歸各二兩

右四味

以水七升煮取二升分三服日

三○又方

取猪脂酒服三合日三小兒服一合臘月者

治小便不利重中疼痛小腹急痛者方

通草

茯苓各三兩薤白二兩

右三味治下篩以水服方寸七

日三○又方

蒲黃滑石各等

右二味治下篩酒服方寸七日三

治小便不利膀胱脹水氣流腫方

水上浮萍曝乾為末服方寸七日三

治小便不通方

滑石三兩葵子二兩榆根白皮一兩

右三味治下篩煮麻子汁一升半取一升以散

二方寸七和分三服即通○又方

水四升洗甌帶取汁煮葵子取二升半分二服○又方

尿 鼓鑪一

右二味搗丸如梧子大服三丸日三○又方

髮去垢燒末葵子一升以飲服方寸七

日三○又方

石首魚頭石為末水服方寸七日三○又方

石槽塞灰土以井花水服之

日三○又方

車前子

一味為末服方寸七日三服百日止

治卒不得小便方

吞雞子白取瘥葛氏云吞黃

○又方

車前子一把桑白皮半兩

右二味以水三

升煎取一升頓服之

治婦人卒不得小便方

郁李仁二十枚煮末服之立下

一本作杏仁二枚

○又方

紫苑為末以井花水服三

指撮立通血出者四五度服之

衍義

滑石茯苓通草甘淡利竅泄熱貝子白朮芍藥重堅除熱益氣說見前治百種淋諸種淋兩方

中茲不復贅

葵子茯苓滑澤利竅白朮當歸健脾和血

酒服猪脂滋血通津

通草茯苓薤白上

泄肺氣

蒲黃滑石下散瘀血

浮萍外開鬼門

滑石葵子榆皮滑澤利竅

甌帶汁煮葵子氣通

於上津通於下

燕泥豆豉解熱化毒

髮灰葵子散血利水

石首腦重堅利水

鯉魚齒專主石

淋

石槽塞灰通塞利竅

車前子利水而不傷津

雞子清化熱而滋津液

車前子清利於下

桑白皮開泄於上

郁李仁治大腹水腫面目四肢浮利小便水道

紫苑疎肺散結氣利水通滯血

治黃瘰後小便淋瀝方

猪腎一具

茯苓一斤瞿麥六兩車前根切

黃芩三兩

椒目三合澤瀉

地膚

子略四

右八味以咀以水二斗煮車前取一斗六升去滓下猪腎煮取一斗二升去腎下藥煮取三

升分為三服

衍義

黃瘰後小便淋瀝熱下趨水道必其人腎氣逆上而喘故用椒目兼猪腎引入腎臟與前地

膚子湯功用彷彿總取去濕熱之治也

治瀉淋方

水三升煮船底苔如鴨子大取二升頓服○又方 水三升煮豉一升一沸去滓內鹽一合

頓服亦可單煮豉汁服之○又方

搗葵子末湯服方寸七○又方 空腹單茹蜀葵一滿口○又方

熱鹽熱熨小腹冷復易亦治小便便不通

衍義

若性本寒取船底者善於行水 鹽豉利水解毒 葵子於根滑澤利竅 鹽熨鹽熨與堅下

氣

灸法

臍中著鹽灸二壯治小便不通

又法灸關元五十壯

又灸使玉泉相去一寸半三十壯

石淋方

車前子一升以絹袋盛水九升煮取二升隔宿不得食平旦空腹頓服之食即出

治熱淋之

又方

取浮石使滿一手許為末水三升醋一升煮取二升澄清服一升不過三服石出

又方

桃膠棗許大夏以冷水三合冬以湯三合和服日三當下石子如豆即以石盡止

衍義

本經車前治氣癰止痛石淋亦能療之 浮石化老痰散結塊為石淋之專藥 桃膠散結血

通津液不獨治石淋也

灸法

石淋臍下三十六種病不得小便灸關元三十壯

又灸氣門三十壯

又灸水泉三十壯

是也

治膏淋方

搗蓬草汁二升酢二合和空腹頓服之當尿如小豆汁也

又濃煮汁飲亦治淋瀝

是也

衍義 淫草一名勒草專主五淋利小便以其蔓生多刺恐透表故取酢之酸以收之

治五勞七傷八風十二痺勞結為血淋熱結為肉淋小便不通並中痛及小腹痛不可忍者方 滑石

桂心 冬瓜子 王不留行 通草 車前子各二分 甘遂一分 石葦四分 右八味治下篩以麻子飲

半升和服方寸七日三尿沙石出 一方加榆白皮三分

衍義 勞傷血淋而用甘遂之苦寒恐傷胃氣即以桂心之辛溫助諸藥之利水

灸法

勞淋灸足太陰百壯穴在內踝上三寸三報之

治熱淋方 葵根切一升冬用 大棗仁 右二味以水三升煮取一升二合分二服 熱者加黃芩一

兩 出難加滑石二兩 血者加茜根三兩 痛者加芍藥二兩○又方 白茅根切四斤以水一斗

五升煮取五升服一升日三夜二○又方 常煮冬葵根作飲服之

衍義 葵根利竅大棗行津乃散中寓補之上藥可無熱 寒起之患 白茅根瀉熱取其通津 冬

葵根利水取其走竅其花隨朝暮而向日性之流利可知

治血淋小便礮痛方 雞蘇二兩 通草 滑石各五兩 竹葉一把 生地黃半斤 小蓴根一兩 右六味吹咀

以水九升煎取三升去滓溫分三服

石葦散 治血淋方 石葦 當歸 蒲黃 芍藥等分 右四味治下篩酒服方寸七日三○又方

生大麻根十枚以水五升煮取二升頓服使血小○又方 大豆葉一把以水四升煮取二升頓服○

又方 葵子一升以水三升煮汁取一升日三服治血

衍義 血淋雖用地黃煎根不得雞蘇通草行葉滑石不能導血前通 石葦治癃閉不通為歸芍蒲

黃導血之宣使 麻根散血 豆葉祛暑 葵子利竅皆血淋之小方隨宜取用可也

灸法

血淋炙丹田隨年壯

又灸伏留五十壯

年壯

五淋不得小便灸懸泉十四壯穴在內踝前一寸斜行

小脈上是中封之別名

五淋灸大敦三十壯

卒淋灸外踝尖七壯

淋病九部諸疾灸足太陽五

十壯 淋病不得小便陰上痛灸足太衝五十壯

腹中滿小便數起灸玉泉下一寸名尿胞一名尿

骨端灸二十七壯小兒以意減之

治遺尿小便澀方

牡蠣

鹿耳

各四兩

桑耳

各二兩

阿膠

二兩

右四味咬咀以水七升煮取二升分二

服日二〇又方

防己

葵子

防風

各二兩

右三味咬咀以水五升煮取二升半

分三服作散服亦

住

治小便失禁方

以水三升煮雞腸取一升分三服〇又方

取雞腔脰一具并腸燒末酒服男雌女雄

治尿淋方

取羊肚系盛水令滿縛兩頭熟煮即開取中水頓服立瘥〇又方

取羊胞盛水滿中炭

火燒之盡熟空腹服不過四五度瘥

衍義

牡蠣鹿耳阿膠桑耳治遺尿虛寒之遺溺

防己防風向日葵子治風襲胞中之失澀

雞腸

膀胱能助引經開合之權

羊肚羊胞善補膀胱氣化之力取血氣以助血氣耳

灸法

遺尿失禁出不知知灸陰陵泉隨年壯

遺溺灸遺道俠玉泉五寸

又灸陽陵泉

又灸足陽明各隨

年壯

小便失禁灸大敦七壯

又灸行間七壯

尿淋

垂兩手兩脾上盡指頭上有陷處灸七壯

又灸臍下橫七壯

溺血第三方十三首

治房勞傷中尿血方

牡蠣

桂心

黃芩

車前子

各等

右四味治下篩飲服方寸七稍加至二十七

日三服

衍義

方中寒熱通澀互用脫能使之飲蓄能使之通標本兼濟之妙用萃於四味之中

治小便血方 生地黃八兩 柏葉一把 黃芩 阿膠各二兩 右四味咬咀以水八升煮取三升去滓下膠

分三服 一方加甘草二兩

衍義 此方專為陰火亢盛者設若素虛羸者慎用

又方 兔絲子 蒲黃 白芷 荆實 乾地黃 酸棗小品作散 芎藭 葵子 當歸 茯苓等分 右

十味為末蜜丸如梧子大飲服五九日三服稍加至十丸

衍義 和血涼血散血而兼制水收津祛逆虛風六法聚於一方而不病其繁冗

又方 戎鹽六分 甘草 蒲黃 鹿角膠 芍藥各二兩 礬石三兩 大棗十枚 右七味咬咀以水九升煮

取二升分三服

衍義 溺血既久不得以收飲津氣為務然治病火盛者不但鹿膠難用礬石尤非所宜

又方 胡麻三升搗細末以東流水二升漬一宿絹絞去滓煮一二沸頓服○又方 龍骨為細末溫水

服方寸七日五六服張大仲云酒服○又方 酒三升煮蜀當歸四兩取一升頓服○又方 搗荆葉取汁酒

服二合○又方 煮東前根葉子多飲佳○又方 酒服亂髮灰蘇澄用水服○又方 酒服葵根灰方寸

七日三○又方 豉二升酒四升煮取一升頓服○又方 刮滑石末水和傅繞小腹及陰際佳葛氏云治

小便不通

衍義 胡麻一名巨勝性溫而燥專補腎之陽審其血色晦淡者為之合劑若陰虛多火血色鮮紫而

痛者良非所宜世以胡麻為潤殊失本經補五臟之意 龍骨澹滯苟非虛脫慎勿誤投 當歸酒煮

取其和血 荆葉酒服取其治風 車前利水 髮灰散血 葵灰通滯 豉酒敗毒 滑石末外傳

以通熱結此惟夏秋濕熱為患煮宜之

水腫第四論三首 方四十九首

論曰大凡水病難治屢後特須慎於口味病水人多嗜食所以此病難愈也代有醫者隨逐時情意在財

物不本性命病人欲食勸令食羊頭蹄肉如此未有一愈者又此病百脈之中氣水俱實治者皆欲令渴之羊頭蹄極補那得愈愈所以治水藥多用葶藶等諸藥本草云葶藶之腹令人大虛故水病非久虛不得絕其根本又有蠱脹但腹滿不腫水脹四肢面目俱腫醫者不善診候治蠱以水藥治水以蠱藥或但脹滿皆以水藥仲景所云愚醫殺之今錄忘如左

喪孝 產乳 音樂 房室 誼戲 一切魚 一切肉 一切生冷 酢滑 蒜 粘食米豆油膩

其治蠱方具在雜方篇見第二十四卷蠱毒篇中 右前所禁不得食不得用心其不禁者并具本方之下其房室等禁須三年慎之永不復發不爾者雖瘥復發不可更治也古方有水導丸應驗多利大便而不利小便所以不錄

黃帝問岐伯曰水與膚脹鼓脹腸胃石瘕何以別之岐伯曰水之始起也目窠上微腫作微腫太素如新卧起之狀其頸脈動時咳陰股間寒足脛腫腹乃大其水已成也以手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也膚脹者寒氣客於皮膚之間穀穀然而堅作太素外臺腹大身盡腫皮厚按其腹陷作太素而不起腹色不變此其候也鼓脹者腹脹身腫大大與膚脹等色蒼黃腹筋起此其候也腸胃者寒氣客於腸外與胃作太素氣相搏正氣不得營因有所繫癖而內者惡氣乃起息肉乃生其始生也大如雞卵稍以益大至其成也如懷子之狀久者離歲月按之則堅推之則移月事時下此其候也石瘕者生於胞中寒氣客於子門子門閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉血以留止日以益大狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下之曰膚脹鼓脹可刺乎曰先瀉其腹之血絡後調其經刺去其血脈師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脈自浮外證骨節疼痛惡風皮水其脈亦浮外證浮腫按之沒指不惡風其腹如鼓不渴當發其汗正水其脈沉遲外證有喘石水其脈自沉外證腹滿作太素不喘黃汗其脈沉遲身發熱胸滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿心水者身重作太素而少氣不得卧煩躁其人陰腫肝水者腹大不能自轉側脇下腹中痛時時津液微生小便續通脾水者腹亦大四肢苦重津液不生但苦少氣小便難

肺水者其身腫小便難時時鴨澹腎水者其人腹大臍腫腰痛不得溺陰下濕如牛鼻上汗其足逆冷其面反瘦師曰諸有水者腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗乃愈問曰病下利後渴飲水小便不利腹滿因腫者何也師曰此法當病水若小便自利及汗出者自當愈肝鬱凡水病之初先兩目腫起如老雞色俠頸脈動股裏冷腔中滿按之沒指腹內轉側有聲此其候也不即治之須臾身體稍腫腹中盡脹按之隨手而起水為已成猶可治也此病皆從虛損所致大病或下利後婦人產後飲水不消三焦決漏小便不利仍相結漸漸生聚遂流諸經故也水有十種不可治者有五第一信黑傷肝第二缺盆平傷心第三臍出傷脾第四背平傷肺第五足下平滿傷腎此五傷必不可治凡水病忌服上出水出水者一月死大忌之

中軍候黑丸

治膽元水先從頭面至腳腫頭眩痛身虛熱名曰元水體腫大小便澀宜此方

方見第十八卷大腸

衍義

衍義見前第十八卷

又云水腫諸治方宜迥別虛實懸殊內經平治權衡各隨風土金匱證

分表裏主治攸分千金專以去苑陳莖疎滌五臟為主以西北水土剛強病生於內故治宜毒藥非若中央地卑土濕合用表裏分解之比至於宣布五陽之法惟東南天地始生之界宜順長養之德斯皆地氣使然所以千金略無及此如論首推中軍候黑丸其大義可默悟矣

治小腸水小腸滿暴腫口苦燥乾方

用巴豆三十枚和皮碎以水五升煮取三升綿漬汁中拭腫上隨

手可減日五六拭莫近目及陰

集驗治身暴腫如吹

衍義 巴豆辛烈太毒不以內治而用外拭乃開鬼門之別境

治大腸水乍虛乍實上下來去方

赤小豆五升桑白皮切二鯉魚四斤白朮八兩右四味以水

三斗煮魚取爛勿用鹽去魚盡食并取汁四升許細細飲下

衍義

肺氣不及州都而滲灌大腸大腸下走魄門隨圖通秘而為虛實故用桑皮瀉肺赤小豆利水

鯉魚散腫生末實脾腫虛不能運水者此方最宜有利水之功無傷中之患所以往往振通身浮腫者尤為合蠟

又方 羊肉一斤商陸切一 右二味以水二斗先煮商陸令爛去滓後內羊肉及葱豉一作一如腫法 用

云治卒腫滿身面黃大

衍義 凡味之辛者皆熱而商陸性寒陰毒味兼苦辛專破濁陰毒邪而羊肉溫補為水腫之切禁反

取以激發商君之性如虎添翼肘後治卒腫滿身面皆大觀一卒字可和病久涉虛者不可輕用且覓

言外

治勝脫石水四肢瘦腹腫方 桑白皮 穀白皮 澤漆葉各三 大豆五升 防己 射干 白木各四

右七味以水一斗五升煮取六升去滓內好酒三升更煮取五升日二夜一餘者次日更服方無

澤漆防己射干只四味

○又方 桑白皮六兩 射干 黃芩 茯苓 白木各四 澤瀉三兩 防己二升 大豆三升

澤漆一升 右九味以水五斗煮大豆取三斗去豆澄清取一斗下藥煮取三升空腹分三服

衍義 方中穀白皮即指白皮澤漆防己射干皆利水峻劑佐以桑皮泄肺大豆解毒生木實脾利水

加酒以助諸藥之力 又方不用穀白皮而用黃芩茯苓澤瀉用法雖似稍平功用與前不異

治胃水四肢腫腹滿方 猪腎一具 茯苓四兩 防己 橘皮 元參 黃芩 杏仁 澤瀉一作桑白皮

各一 猪苓 白木各三 大豆三升 右十二味以水一斗八升猪腎大豆澤瀉桑白皮取一斗共

煮澄清去滓內餘藥煮取三升分三服若咳加五味子三兩 凡服三劑間五日服一劑常用有效

衍義 四肢為諸陽之本胃中清陽為濁陰所汨不但腹腫而腹亦滿其治與勝脫不甚相遠但去澤

漆射干易入橘皮元參杏仁猪苓并取水獸之腎為利水之嚮導

有人患氣急積久不瘥遂成水腫如此者眾諸皮中浮水攻面目身體從腰以上腫以此發汗方 麻黃

三兩甘草一兩 右二味以水五升煮麻黃再沸去沫內甘草煮取三升分三服重覆取汗愈慎

風冷等

衍義

此本金匱治裏水方取以微發在裏之水千金借治皮水腰以上腫專得內經之開鬼門法

治面目手足有微腫常不能消者方

以楮葉切二升水四升煮取三升去滓內米煮作粥食如常食勿

絕冬則預取葉乾之準法作粥周年永瘥慎生冷一切食物

衍義

楮實肝腎血分藥別錄治陰痿水腫千金用葉煮水作粥取其浸漚以利小便其意不材之本

反有厥功

治面腫小便澀心腹脹滿方

茯苓 杏仁 枳殼 防己 葶藶 各五 蘇子 三合

右六味為末蜜

丸如小豆服十九以桑白皮湯送下日二服加至三十九

衍義

此上下分消之輕劑杏仁橘皮蘇子開發於上茯苓防己泄利於下葶藶上走肺而下達膀胱

也

治大腹水腫氣息不通命在旦夕者方

牛黃 二分 椒目 三分 昆布 海藻 牽牛子 桂心 各八 葶藶

六分

右七味為末另搗葶藶如膏蜜和丸如梧子飲服十九日二稍加小便利為度太良 正觀九

年漢陽王惠水醫所不治余處此方日夜尿一二斗五六日即瘥

衍義

此上下分消之重劑牛黃椒目通利於上昆布海藻牽牛葶藶降泄於下桂心辛溫散結以通

上下之血氣也

有人患水腫腹大其堅如石四肢細小勞苦足脛腫小飲食使氣急此終身之疾服利下藥不瘥者宜服

此藥微除風濕利小便消水穀歲久服之乃可得力瘥後可常服方 鬼箭羽 丹參 白朮 獨活

各五 秦艽 猪苓 各三 知母 海藻 茯苓 桂心 各二 右十味咀咀以酒三斗浸五日服五合日

三任性量力漸加之

衍義

終身之疾攻之不瘥不無性命之憂吳若和其血氣兼除風水以圖的安為愈也

治水腫利小便酒客虛熱當飲冷水腹腫脹滿方 商陸四兩甘遂一兩芒硝 芫花略二吳茱萸

三兩

右五味為末蜜丸如梧子大飲服三九日三一 方有大黃二兩猪苓麝香各一兩

衍義

四味峻逐水腫之藥得吳茱萸一味溫中散逆而破水諸味皆靈活矣

大豆散

治久水腹肚如鼓者方 烏豆一斗熬令香勿令大熟去皮為細末篩下餵粥皆得服之初服

一合稍加之若初服多後即嫌臭服盡重作取瘥止不得食肥膩渴則飲羹汁慎酒肉雞魚生冷酢滑

房室得食漿粥牛羊兔鹿肉此病難治雖諸大藥九散湯膏當時暫瘥過後復發惟此散瘥後不發終

身服之終身不發矣其所禁食物常酒少鹹其酸意○又方 葶藶末蒼耳子灰各七 右二味水調

和服之日二○又方 椒目沉水者取熬搗如膏酒服方寸七○又方 水煮馬兜鈴服之

治水氣腫鼓脹小便不利方 葶藶子一升粘羊肺一具精 右二味先洗羊肺湯微滾之薄切曝乾作

末以三年大醋漬若子一時時出熬令變色熟搗如泥和肺末蜜合搗三千杵為丸如梧子大食後

一食久以麥門冬飲服四九日三以喉中乾口粘浪語為候數日小便大利佳山連治韋司業得瘥司

業經雲裏所述云數日神驗

麥門冬飲方 麥門冬五枚米五升 右二味以水一升和煮米熟去滓下前丸藥逆口作服用之

衍義 黑大豆粥雖有清熱解毒之功畢竟氣味雍濁如何可治水腫腹大以意推之當是石藥雖發

乃為合劑 又方用葶藶泄肺愈脹蒼耳精毒散風皖成則能散血 椒目專主上腎氣逆之喘馬

兜鈴車泄肺氣上壅之滿 葶藶走而不守故須醋制稽留其性以剋痰涎垢膩用於羊肺為引以通

氣化服用麥門冬飲以通肺胃之津液也

徐玉煮散 治水腫利小便方 生商陸 防己 羌活 人參 丹參 牛膝 升麻 防風 秦光

生薑屑 穀皮 紫苑 杏仁 附子 石斛 略二桑白皮 六兩 橘皮 白朮 澤瀉 茯苓 郁李

仁 猪苓 黃連 略一 右二十三味治下篩為粗散以水一升半煮三寸七取一升頓服日再不能

者但一服兩三月以前可服主利多而小便澀者用之大驗

衍義 水腫多由寒熱錯雜邪正交并病氣津氣結成一片上下閉塞不通草辨風秘氣秘熱秘寒秘

瘀血固結而秘故此方兼五者而治專以利水為務

諸證漢防已散 治水腫上氣方 漢防已 澤漆葉 石葦 澤瀉各五 桑白皮 白朮 丹參 赤

茯苓 橘皮 通草各三 生薑十兩 郁李仁五合 右十二味治下節為粗散以水一升半煮三方寸

七取八合去滓頓服日三取小便利為度

衍義 散中桑皮橘皮生薑開泄肺氣於上防已澤漆石葦澤瀉茯苓通草郁李仁通利膀胱於下丹

參白朮和血通津於中尤為去積陳望潔淨府之專藥兼通病人之元氣強弱而為損益可也

茯苓九 治水腫數難為安康公處此方 茯苓 白朮 椒目各四 木防已 葶藶 澤瀉各五 甘遂

計二 赤小豆 前胡 芫花 桂心各二 芒硝各一 右十二味為末蜜丸如梧子蜜湯下五九日一

稍加以知為度

衍義 丸中芫花甘遂葶藶芒硝椒目防已兼走二便佐以茯苓白朮桂心澤瀉前胡赤小豆利水下

氣之味深得峻藥緩攻之妙

治水腫利大小便方 大黃 白朮 葶藶 木防已 各等 右三味為末蜜丸如梧子大飲下十九大小便

利為度不知加之○又方 葶牛子為末水服方寸七日一以兩便利為度○又方 葶藶生用 桂心

各等 右二味為末蜜丸如梧子大飲下七九日二以知為度○又方 郁李仁 米麴 右二味

和作餅子七枚燒熟空腹熱食四枚不知加一枚以至七枚 大黃走瀉道防已利水道白朮實脾利

水使大黃之性兼行冷道所以服後得水便利為度 葶牛專於行水走大小便 葶藶利水愈脹得

桂心以散結積滯 郁李仁本經專主大腹水氣面目四肢浮腫大便風秘亦能療之○又方 水

銀三兩 葶藶子 椒目各一 芒硝五兩 茯苓二枚 水碎 瓜蒂 滑石各一 右八味搗葶藶令

細下水銀更搗令不見水銀止別搗椒目令細搗瓜蒂水萍下篩合和餘藥以蜜和更搗三萬杵成丸
初服一丸如梧子大次服二丸次服三丸次服四丸次服五丸次服六丸至七日還從一丸起次服二
丸如是每至六丸還從一丸起始服藥當咽喉上有癰子腫起煩車腫滿齒斷皆腫唾碎血出勿怪也
不三五日即消所苦皆瘥已上服藥若下多停藥以止利藥至五下止病未瘥更服病瘥止此治諸體
肉肥厚按之不陷甚者腎粗著衣袖不受及十腫大水醫不治者悉主之神驗深師集驗陶氏古今錄
驗無衣魚水萍瓜蒂消

衍義

葶藶愈脹椒目定喘芒硝破結衣魚利水水萍散表瓜蒂逐濕滑石利竅其搜逐宿病之力尤
在水銀然性稟陰毒莫若以輕粉代用即水銀所恨追逐毒邪從齒縫中出可無留積腸胃之患

澤漆湯

治水氣通身浮腫四肢無力或從消渴或從黃疸支飲內虛不足榮衛不通氣不消化實皮膚
中喘息不安腹中響脹滿眼目不得視方 澤漆根十兩鯉魚五斤生薑八兩赤小豆二兩茯苓三兩

人參 甘草 麥冬各二兩 右八味或咀以水一斗七升先煮魚及豆減七升去魚豆內藥煮取四升

半一服三合日三人弱日二氣下喘止可至四合時小便利腫減或大便溏下小便若不利還增一

合以大利便止若無鯉魚鮓魚亦可用若水甚不得卧卧不得轉側再加澤漆一斤渴加括蓐根二兩

咳嗽加紫苑二兩細辛一兩款冬花一兩桂心三兩增魚汁二升胡洽無小豆麥冬有澤瀉五兩杏仁
咳逆氣喘腹大而響內足腫目下有卧蠶狀微渴不得安卧氣奔短氣有
因乃瘦小便難少而數肺病胸滿隱宜利小便水氣迫腫翁翁塞熱

猪苓散 治虛滿通身腫利三焦通水道方 猪苓 葶藶 人參 元參 五味子 防風 澤瀉

桂心 狼毒 椒目 白朮 乾薑 大戟 甘草各二兩 茯苓二兩 女麴 三合 赤小豆 二合 右十七

味治下篩酒服方寸七日三夜一老小一七以小便利為度

衍義 澤漆鯉魚茯苓赤小豆功專利水生薑辟除濁氣麥門冬通調津液人參甘草扶助胃氣以行

藥力既能養正復可祛邪 猪苓散中葶藶大戟即前方澤漆之意猪苓澤瀉桂心白朮椒目乾薑即

方

前方鯉魚茯苓生薑赤小豆之意蓋蒼五味子即前方麥門冬之意且多防風狼毒法雖元參祛風攻

積等藥而用人參甘草助胃行藥之意則一藥雖迥異而主治不殊

麻豆煎

治水氣通身浮腫百藥不瘥待死者方 大麻子脂者佳新赤小豆不得一粒 右二味皆以新

精者淨揀擇水淘洗曝乾蒸麻子使熟更曝令乾貯淨器中欲服取五升麻子熟令黃香以緩火勿令

焦作極細末以水五升攪取汁令盡貯淨器中且欲服令夜以小豆一升淘浸至旦乾漉去水以新

水煮豆未及好熟即漉出令乾內麻子汁中煮令大爛熱空腹吞服日三服當小心悶少時即止五日

後小便數或赤而唾粘口乾不足怪之服訖常須微行未得即卧十日後鍼灸三里絕骨下氣不喘氣

不泄盡服藥後五日氣逆不可下者取大鯉魚一頭先死者去鱗尾等以湯脫去滑淨洗開肚去臟以

上件麻汁和小豆完煮令熟作羹入葱豉橘皮生薑紫蘇調和食之始終一切斷鹽渴即飲麻汁秋冬

暖飲春夏冷飲常食不得至飽止得免飢而已慎房室嗔怒大語高聲酒麴油醋生冷菜茹一切魚肉

鹽醬五辛并治一切氣病服者皆瘥凡作一月日服之麻子熟時多收新甕貯擬施人也

行義 麻仁為補中益氣之上藥而初服令人作瀉以其性潤能祛腸胃中委積之物下行也久服令
人肥健辟穀方多用之小豆色赤通利小腸下達膀胱與麻仁同清腸胃開水穀陳氣病人正氣本虛
不勝湯藥蕩滌者此方最宜而服之心問者味專服多藥與腹中水氣留積不能流布故須鯉魚和麻
汁作羹引之小泄方得漸瘳斷鹽戒色庶無水氣乘虛復助腎邪之患
又方 吳茱萸 華撥 昆布 杏仁 葶藶 右五味為末蜜丸如梧子服五丸勿令飽食食訖
飽悶氣急服之即散
衍義 氣滯則水逆氣下則水通然須胃氣有權則水精得以敷布吳茱萸華撥溫中下氣專行固本
杏仁葶藶泄肺利水專行散標昆布鹹寒潤下為下十二種水之嚮導
苦瓠丸 治大水頭面遍身腫脹方 苦瓠白覆實揀如大豆以麴覆煮一沸空腹吞七枚至午當出水

一升三四日水自出不止大瘻乃瘥三年內慎口味苦飢須好無厭翳細理研淨者不爾有毒不堪用
崔氏用子作饑餓服二十粒瘻者牛乳服之如此隔日作服○又方 苦飢膜二分 葶藶子五分
加至三粒以小便利為度小便便若太多即一二日停此服

右二味合搗為丸如小豆大服五九日三○又方 太棗肉七枚 苦飢膜一枚 右搗為末丸一服三

丸如人行十五里久又服二丸水出更服一丸即止○又方 葶藶 桃仁各等 右二味皆熬合搗

為丸服之利小便一方用杏仁○又方 搗生葶藶子酢和服以小便數為度○又方 燒薑石令赤

內黑牛尿中令 服一升日二○又方 單服牛尿太良凡病水服無不瘥服法先從少起得下為度

又方 煎人尿令可丸服如小豆大日三

衍義 飢最苦寒大傷胃氣惟葶藶之人病氣復實方可應用 加以葶藶破水尤捷 飢得棗肉雖

稍變其勢苟可他圖慎勿輕試 葶藶下水桃仁散血審非血諦不若杏仁為捷 葶藶以屬故用

酢以酸收之 薑石解毒散結用黑牛尿引入膀胱之處 單服牛尿專滌胃中積水審係胃實方可

投之 人尿煎丸以滌膀胱積垢較秋石之力愈速

治水通身腫方 前楮椒枝葉如錫空腹服一七日三瘡以汁洗之

衍義 楮椒根辛溫氣濁故可以治濁除填塞經脈通身水腫較之苦飢大漏

又方灸法 灸足第二趾上一寸隨年壯 又灸兩手大指縫頭七壯

麻黃煎 治風水通身腫欲利小便方 麻黃 茯苓 澤漆各四 防風白朮各五 杏仁 大戟各四

黃芪猪苓各三 獨活八兩 大豆二升水 煮一斗清酒一升 右十三味咬咀以豆汁酒及水一斗合煮取六

升分六七服一日一夜令盡當小便極利為度

大豆散 治風水通身大腫眼合不得開氣欲絕方 大豆一升 杏仁 麻黃 木防己 防風 猪

苓各四 澤瀉 黃芪 烏頭各三 半夏六兩 生薑七兩 茯苓 白朮各五 甘草各二 清酒一升

右十六味咬咀以水一斗四升煮豆取一斗去豆內藥及酒合煎取七升分七服日四夜三得小便快

利為度腫消停藥不必盡劑若不利小便者加生大戟一升葶藶二兩無不快利萬不失一深師方無
烏頭半
烏甘逆

治風水腫方 大豆三升茯苓 白朮 防風 橘皮 半夏 生薑各五兩 蠶甲 當歸 防己 麻黃

猪苓三升 大戟一兩 葶藶一升 桑白皮五升 以水二升 煮取五升 服八合日三服去如人行十里久再服

衍義 麻黃杏仁防風獨活開鬼門專取黃芪助力澤漆大戟猪苓澤瀉茯苓以利水府尤賴白朮實

脾黑豆汁解毒清酒和榮以助諸藥營行中外之力 大豆散則以甘遂防己易去麻黃煎中澤漆大

戟加烏頭半夏甘草生薑專為陰邪逆滿眼合不開故用以通陽氣散陰結且得烏頭半夏甘遂甘草

反激之大力可無藉於獨活之祛風也 治風水腫方兼採二方中十味參入橘皮桑皮當歸蠶甲葶

子雖較前 方性味稍遜而兼表裏則一

麻子湯 治遍身流腫方 麻子五升 赤小豆三升 當陸一升 即防風三兩 附子一兩 右五味以咀先

搗麻子令熟以水三斗煮麻子取一斗三升去滓內藥及豆煮取四升去滓食豆飲汁

衍義 五味藥中葶藶開鬼門澤瀉府宣希五陽之法而實借附子防風以振麻子亦小豆商陸之勢

大豆煎 治男子女人新久腫得暴惡風入腹婦人新產上圍風入臍腹中如馬鞭者噓吸短氣咳嗽方

大豆一斗淨擇以水五斗煮取一斗五升澄清內金中以一斗半美酒內中更煎取九升宿勿食平旦

服三升溫覆取汁兩食頃當下去風氣腫退慎風冷十日平復除日合服佳若急不可待遂急合服腫

不盡退加之腫差更服三升若十分瘥勿服病中亦可任性飲之使酒氣相接附後云腫瘥後 又方

猪皮枝葉一大束切煮取汁隨多少醱酒但飲醉為佳不過三四日腫少退瘥後可常服之○一方

用猪椒皮枝葉○又方 鯉魚長一尺五寸以尿淹漬一宿平旦以木篋從口中貫至尾燄火炙令微

熟去皮宿勿食空腹頓服之不能者分再服勿與鹽

摩膏 治表凡腫病須百日內外攻之不可一概方 生商陸 一 猪膏得三斤 右二味和煎令黃

去滓以厚腫亦可服少許并塗以紙覆上燥輒傳之不過三瘥

麝香散 治婦人短氣虛羸過身浮腫皮膚急人所稀見方 麝香三銖雄黃六銖芫花 甘遂各二

右四味為末酒服五七老少以意增減亦可為丸如小豆大強者服七丸 小品無雄黃深師以蜜丸如

滴水在胸外名曰水病腹大在腹表用大 麝香丸華池方肘後有人參二分為丸服

〔衍義〕大豆散與豆淋酒仿佛能搜腎經風毒然必黑者方得下達膀胱 猪膏腎肝血分藥千金獨

取其葉醱酒以治水腫物雖賤而忍掩沒其功乎 鯉魚之利水天性使然加以尿淹引入膀胱取鹹

代鹽而無助虐腎邪之害 摩膏用商陸猪脂外摩消腫其法最善取服良非所宜此眼眩之品不減

苦飭苟非水土剛強實壯實病邪全盛之時難以任此吾吳風氣柔弱每見愚醫不審而率意妄投

未有不相引喪亡而已因識此以為盲瞽之戒 麝香散開竅破陰利水消腫較之苦飭丸等方差勝

治虛勞浮腫方 灸太衝百壯 又灸腎膈

孫真人備急千金要方衍義卷三十一終

卷三十一

上二

卷之四

[illegible][illegible]

癰腫毒方

丁腫第一 論一首 方二十九首
證十五首 灸法一首

論曰夫稟形之類須存攝養將息失度百病萌生故四時代謝陰陽遞興二氣更相擊怒當是時也必有暴氣夫暴氣者每月之中卒然大風大霧大寒大熱若不時避人忽遇之此皆入人四體頓折皮膚流注經脈遂使腠理壅滯榮衛結滯陰陽之氣不得宣泄變成癰疽下毒惡瘡諸腫至于丁腫若不預識令人死不逮辰所以養生之士須早識此方凡是瘡瘍無所逃遁 凡療丁腫皆刺中心至痛又刺四邊十餘下令血出去血傳藥藥氣得入鍼孔中若不達瘡內療不得力又其腫好著口中頻邊古上見赤黑如珠子發痛應心是也是秋及寒毒久結皮中變作此疾不即療之日夜根長流入諸脈數道如箭入身捉人不得動搖若不慎口味房室死不旋踵經五六日不瘥眼中見火神昏口乾心煩即死也 一曰麻子丁其狀肉上起頭大如黍米色稍黑四邊微赤多癢忌食麻子及衣布勿入麻田中行 二曰石丁其狀皮肉相連色烏黑如黑豆甚硬刺之肉內陰陰微疼忌瓦礫磚石之屬 三曰雄丁其狀頭黑腫四畔近瘡胞繫起有水出色黃大如錢孔形高忌房事 四曰雌丁其狀瘡頭稍黃向裏腫亦如父瘡四畔胞繫起心凹色赤大如錢孔忌房事 五曰火丁其狀如湯火燒灼瘡頭黑腫四邊有胞繫起如赤粟米忌火炙燥 六曰爛丁其狀色稍黑有白瘰瘡中潰潰則有膿水流出血形大小如匙面忌沸熱食一帛物 七曰三十六丁其狀頭黑浮起形如黑豆四畔起大赤色今日生一明日生二後日生三乃至十若滿三十六約所不能治如未滿三十六者可治俗名黑炮忌喫怒薑精愁恨 八曰蛇眼丁其狀瘡頭黑皮上浮生形如小豆狀似蛇眼大體硬忌惡眼看并嫉妒人見之及毒藥 九曰鹽瘡丁其狀大如匙面四畔皆亦有黑粟粒起忌食鹹物 十曰水洗丁其狀大如錢形或如錢孔大瘡頭白裏

黑麋汁出中硬忌飲漿水水洗渡河 十一曰刀鐮丁 其狀瘡濶狹如薤葉大長一寸左側肉黑如燒

爍忌刺及鐮刀切割鐵刀所傷可以約治 十二曰浮溫丁 其狀瘡體曲圓少許不合長而狹如薤葉

大外黃內黑黑處刺不痛內黃處刺之則痛 十三曰牛拘丁 其狀肉胞起指不破 右十三種瘡初

起必先瘡後痛先寒後熱熱定則寒多四肢沉重頭痛心驚眼花若大重者則嘔逆嘔逆者難治其麻子

丁二種始末惟瘡所最忌者不得犯觸犯觸者即難療其浮溫丁牛拘丁二種無所禁忌縱不瘡亦不能殺

人其狀寒熱與諸丁同皆以此方療之萬不失一欲知犯觸之狀但背強瘡痛極甚不可忍者是也 治

十三種丁方 用枸杞其約有四名春名天精夏名枸杞秋名却老冬名地骨春三月上建日採葉夏三

月上建日採枝秋三月上建日採子冬三月上建日採根凡四時初逢建日取葉子枝根等四種並曝

乾若得五月五日午時合和太良如不得依法採者但得一種亦得用緋縮一片以裹藥取匣為限亂

髮雞子大牛黃梧子大反鉤棘鍼二十七枚為末亦小豆七枚末先於緋上薄布亂髮以牛黃末等布

上曝即捲緋續作團以髮作繩十字縛之熨斗中急火熬令沸沸定後自乾即刮取搗為末絹篩以一

方寸七取枸杞四味合搗絹篩取二七和合前一七共為三七令相得八分為一分早晨空腹酒服一

分日二

〔衍義〕熱淫於內瀉以甘寒丁腫感四時之暴氣受五味之毒邪故取專瀉三焦之枸杞根皮薄亂髮

牛黃棘刺赤小豆共襄散火解毒通治諸丁洵為開編首列之專方也

齊州榮姥凡 凡是丁腫皆用治之方 壯蠟燭兩鍾乳 枸杞根皮兩 白石英 二兩 桔梗半兩 白薑

石 齒者 右六味各搗絹篩合和令調先取伏龍肝九升為末以清酒一斗二升攪令輝澄清取二

升和約捻作餅子大六分厚二分其濁滓仍置盆中布餅於籠上以一幅紙藉盆上以泥酒氣蒸之仍

升攪令氣散發經半日約餅子乾乃內瓦罏中每一重紙一重約過布勿令相著以泥密封三七日乾

以紙袋貯置乾處舉之用法以鍼刺瘡中心深至瘡根并刺四畔令血出以刀刮取藥如大豆許內瘡

上若病重困日三四度輕者一二度著重者二日根爛始出輕者一日半日爛出當着瘡浮起是根出之候若根出已爛者勿停藥仍著之藥甚安穩令生肌易其病在口咽及胸腹中者必外有種異相也寒熱不懷疑是此病即以飲或清水和藥如二杏仁許服之日夜三四服自然消爛或以物剔露根出即瘡當着精神自覺醒悟合藥以五月五日為上七月七日為次九月九日臘月臘日皆可若急須藥他日亦得修合須清淨燒香不得觸穢無令孝子不具足人產婦六畜雞犬等見之凡有此病者忌房室猪羊雞魚生韭葱蒜芫薺胡荽葵酒醋麪等若犯諸忌而發動者取枸杞根和藥服并如後方其二方本是一家智者評論以後方最是真本

行義 牡蠣與堅鍾乳利數石英欽津並石消腫枸杞瀉火桔梗散氣竈上清酒溫助諸石以拔毒根於中英乳甘溫生肌亦易惟薑石鹹寒為丁腫去腐生新之專藥初起未著形時服之可散二石雖溫然非悍烈之品不慮助邪為虐若至毒邪熾發則又未可嘗試所以說後方最是真本

趙煥方

薑石

二十兩牡蠣十兩

茯苓三十兩

枸杞根皮

四兩

右四味各搗篩合和先取新枸杞根合皮

切六升水一斗半煎取五升去滓內狗屎

二升攪令調澄取清和煎藥熟搗捻作餅子陰乾病者

以兩根刀鍼當頭直刺瘡痛徹拔鍼出刮取藥末急內瘡孔中勿令歇氣并遍封瘡頭上即脹起鍼挑

根即出重者半日已上或已消爛根挑不出亦自瘡勿憂其病在中者外當有腫相應并皆惡寒發熱

以水半盞刮取藥如梧子大五枚和服之日夜三服即自消也若須根出服藥經一日以雞羽剔吐即

隨吐根出若不出根亦自消爛在外者亦日夜三度傳約根出後常傳勿住即生肉易瘡若犯諸忌而

發動者取枸杞根合皮骨切三升以水五升煮取二升去滓研藥末一錢七和枸杞汁一盞服之日二

三服并單飲枸杞汁彌佳又以枸杞汁攪白狗屎取汁服之更良合訖即可用不待乾所言白狗屎是狗食骨其屎色如石灰故言白狗屎也如預製取五月五日七月七日九月九日臘月臘日尤良神驗或有人忽喉中痛作寒乍熱者即是其病當即以此療之無故而痛惡寒發熱者亦是此病但依前服之

立瘡前後二方同是一法其用相同亦主癰疽甚效

衍義 於前榮姓方中除去石英鍾乳又以茯苓易桔梗乃取狗矢同杞根煮汁和藥藥雖污穢而功勝於前

治丁腫病忌見麻勃見之即死者方 胡麻 燭燼 鍼砂等分 右三味為末以醋和傅之

衍義 胡麻解毒燭燼散火鍼砂制熱醋和以收斂發之邪

又方 石灰三分 馬齒二分 右二味搗以雞子白和傅之○石灰乃壯火之餘烈善破陰毒惡瘡本

經有疽瘍瘡熱惡瘡宛肌之治馬齒莧散血消腫雞子白清氣解熱能使丁腫外出勿以賤而忽諸○

又方 鍼刺四邊及中心塗雄黃末立愈神效黃上云塗○又方 鼠新坐土以小兒尿傅之○又方 鐵

衣末以人乳汁和傅之立愈 又方 小豆為末傅之瘡○又方 以人屎汁傅之立瘡○又方 以

四神丹一枚當頭上安經循根即出矣

治一切丁腫方○用蒼耳根莖苗子但取一色燒為灰醋泔洗和如泥塗上乾即易不過十度根即拔神

良余以貞觀四年忽口角上生丁腫達耳子令家母為貼十日不瘡余以此藥塗之得愈以後常作此

藥以救人無不瘡者故特論之以傳後人丁腫方于首皆不及此雖齊州榮姓方亦不能勝此物之造

次易得也

衍義 蒼耳去風除溼燒灰和泥塗治丁腫風去則火毒之勢亦散矣

又方 取鐵漿每飲一斗立瘡○又方 臘月猪脂以麵和封上瘡○又方 蒺藜子一升燒灰瀝醋和

封上經宿便瘡城上更良○又方 皂莢子取仁作末傅之五日內瘡

玉山韓光方 韓光治丁腫人也貞觀初衡州徐使君訪得此方 用艾蒿一担燒作灰於竹筒中淋取

汁以一二合和石灰如麵漿以鍼刺瘡中至滿即點之點三遍其根自拔亦不神良貞觀中用治三十

餘人得瘡效驗之

〔行義〕父蒿之昇艾葉燒灰淋汁和石灰刺點取純陽之性善祛陰毒不在蒼耳之下

魚臍丁瘡似新火鉗瘡四邊赤中央黑可鍼刺之若不痛即殺人治之方以臘月魚頭灰和髮灰等分

〔行義〕

臘月鯉魚頭消腫解毒兼髮灰之散惡血人尿之解毒熱物雖污穢而功不尋常故千金用之

又方以寒食錫傳之良若硬者燒灰塗貼即瘥

治魚臍瘡頭白腫痛不可忍者方先以鍼刺瘡四畔搗白巨汁滴著瘡孔內○又方水獺尿傳太良

治赤根丁方熬白紛令黑蜜和傳之良○又方以新釜鼠壤水和塗之熱則易○又方馬牙齒搗

未臘月猪脂和傳之根即拔燒灰用亦可

犯丁瘡方

無菁根

生鐵衣等分

右二味和搗以大鍼刺作孔復削無菁根如鍼大以前生鐵衣塗

上刺孔中又塗所搗者封上仍以方寸已絛帛塗搗之有膿出即易須臾拔根出立瘥忌油膩生冷醋

滑五辛陳臭粘食無菁去風解毒鐵衣鎮熱開結預杜走黃之虞餘方意會取用不遑贅述○又方

刺瘡頭及四畔令汁盡出搗生栗黃傳上以麵團之勿令黃出從旦至午根拔矣○又方以麴團

瘡如前法以鍼亂刺瘡銅器者醋令沸瀉者麴團中令容一盞冷則易之三度根即出○又方取蛇

蛻皮如雞子大以水四升煮三四沸去滓頓服立瘥○又方燒蛇蛻皮灰以雞子汁和塗瘥○又方

取蒼耳苗搗取汁一二升服之滓傳上立瘥

灸方

灸掌後橫文後五指男左女右七壯即瘥已用得效丁腫灸法雖多然此一法甚驗出於意表也

癰疽第二

脈之首

論一首方八十七首

脈數身無熱即有內癰諸浮數脈當發熱而反洗洗惡寒若有痛處當結為癰脈浮而數身體無熱

其形默默胃中微燥不知痛處其人當發癰腫脈微而遲必發熱脈弱而數此為振寒當發癰腫凡

脈滑而數滑則為實數則為熱滑即為營數即為衛營衛相逆即結為癰熱之所過即為癰腫身有痛處

時時若有瘡 問曰寸口脈微而濇法當亡血若汗出設不汗當云何答曰若身有瘡被刀器所傷亡血之故也 跌陽脈滑而數法當下重少陰脈滑而數婦人陰中生瘡 論曰夫癰疽初發至微人皆不以為急此實奇患惟宜速治稍遲緩即病成以此致禍者不一但發出外皮薄者為癰外皮厚者為疽宜急治之 凡癰疽始發或似小癰或復大痛或復小痛或發如米粒大白膿子此皆微候宜善察之見有小異即須大驚怪急為攻治及斷口味速服諸湯下去熱毒若無醫藥處即灸當頭百壯其大重者灸四面及中央二三百壯數灸不必多也復薄以冷葯種種救療必速瘥也 凡用葯貼法皆當瘡頭處開孔令濕熱氣亦當頭以火鍼鍼入四分即瘥 凡癰疽瘡石癰結筋癰癰瘻皆不可就鍼用鍼角者少有不致禍也 凡癰無問大小已覺即取膠如手掌大煖水浸令軟看大小當頭上開一孔如錢眼大貼腫上令相當須臾乾急若未有膿者即定不長已作膿者當自出若以鋒鍼當孔上刺出膿大好至瘥乃洗去膠 凡腫根廣一寸已下名癰一寸已上名小癰如豆粒大者名胞子皆始作急服五香連翹湯下之數劑取瘥乃止 凡癰高而廣大者不大熱其肉正平無尖而紫者不須攻之但以竹葉黃芪湯申其氣耳肉正平為無膿也癰卒痛以八味黃芪散傳之太癰七日小癰五日其自有堅強者甯生破發乳若熱手不可近者先內服王不留行散外摩發背膏若背生破無若在乳宜令極熱候手按之隨手即起者瘡熱也宜鍼之鍼法要得者膿以意消息胸背不過一寸斟量不得膿即與食肉膏散著兒頭內癰口中如體氣熱歇即服本古斯散五日後癰欲著者即服排癰內寒散 凡癰破之後便綿緩欲死內寒外熱腫有似癰而非者當以手按腫上無所連乃是風毒耳勿鍼之但服升麻湯外摩骨破癰口當令上留三分下近一分鍼之務令極熱熱使不痛破後敗壞不瘥者作猪蹄湯洗之日二度夏用二日冬用六七日用湯半劑亦可凡癰壞後有惡肉者宜猪蹄湯洗去穢次傅食肉膏散惡肉淨後傅生肉膏散及摩四邊令好肉連生當斷絕房事忌風冷勿自勞煩俟筋脈平復乃可任意耳緣新肉易傷傷則裏潰潰則重發發則難救慎之慎之白痴最忌 凡諸暴腫一一不同無有近遠皆服五香連翹湯刺去血以小豆末傅之其間

數數以鍼刺去血若失療已潰爛者猶服五香湯及漏蘆湯下之隨熱多少依方用之外以升麻湯洗
熨之摩生麻膏後丹毒篇若生息肉者以白蘭如散傳之青黑肉去淨即停止好肉生傳升麻膏如肌不
生傳一物黃芪散若傳白蘭如青黑惡肉不盡者可用棗頭蘭如散半錢和白蘭如散三錢稍稍傳之其
散各取當色單搗下篩成散用之此數法集驗或身中忽有痛處如遭打撲之狀名曰氣痛痛不可忍遊
走不住發作有時痛則小熱痛定則寒此皆由冬時受溫氣至春暴寒風來折之不成溫病乃作氣痛宜
先服五香連翹湯摩丹參膏又以白酒煎楊柳皮及暖熨之有赤氣點點者即刺出血也其五香連翹湯
及小竹瀝湯可服數劑勿以一劑未瘥便止以謂藥無效即禍至矣中間將白椒散佳又有氣腫痛其狀
如癰腫無頭虛腫色不變但皮急痛不得手近亦須服此五香次白鍼湯之次與疾黎散傳之 胸中痛
短氣者當入閭室中以手捺左眼視若見光者胸中有結癰若不見光者是癰疽內發出也 經云氣宿
於經絡中血氣俱滯不行擁結為癰疽也又言熱之所作其後為癰又陽氣湊集寒化為熱熱盛則肉腐
為膿也由人體有熱被寒冷搏之而脈凝結不行熱氣擁結成癰疽方有灸法亦有溫治法以其中冷未
成熱之時其用冷藥帖薄之治熱已成以消熱冷不成膿也赤色腫有尖頭者黎蘆膏傳之一云醋和蚌
蛤灰塗乾則易之 余平生數病癰疽得效者即記之考其病源多是藥氣所作或有上世服石遂令子
孫多有此疾食中尤不宜食麵及酒蒜及慎溫牀厚被能慎之者可得終身無他此皆躬自驗之故特論
之也

五香連翹湯 治一切惡核癰疽惡腫患背方 青木香 沉香 丁香 薑蔭香 麝香 連翹

射干 升麻 獨活 寄生 通草 各二兩 大黃 三兩 石十二味 咬咀以水九升煮取四升內竹瀝

三升煮更取三升分三服取快利時後有紫葛甘草無通草治惡肉惡脈惡核風結腫氣痛要辨方

異小 衍義 此方在嬰孩門中治風腫色白故須麻黃黃芩海藻枳實開發表氣為務此治一切惡腫又宜

獨活寄生通草通調血氣為先亦不過立法大意但須方合病情則嬰孺門中未嘗不可借治少壯此方亦未嘗不可借治嬰孺為一切腫瘍利竅開氣泄熱解毒止痛要約惜乎寄生近世絕無真者先哲並用續斷代之不獨此方為然

黃芪竹葉湯 治癰疽發背方 黃芪 甘草 黃芩 芍藥 麥冬 略三當歸 人參 石膏 芫蕪

半夏 略二生薑 五兩生地黃 八兩大棗 三十淡竹葉 一握 右四味咬咀以水一斗二升先煮取竹

葉取一斗去滓內藥煮取三升分四服相去如人行二十里久日三夜一

八味黃芪散方 黃芪 芫蕪 大黃 黃連 芍藥 莽草 黃芩 梔子仁 等分 右八味治下篩

雞子白和如泥塗故帛上隨腫大小傅之乾則易若已開口封瘡上須開頭令歇氣

〔行義〕黃芪排膿止痛能收斂血氣能解熱毒在黃芩竹葉湯中全用保元軍調血滋津之味為助

正祛邪之上藥 八味黃芪散全用三黃雖有芍芫皆協助祛毒之功烏有助正之力哉

王不留行散 治癰腫不能潰困苦無賴方 王不留行 紫合 千金龍骨 當歸 略二野葛皮 半乾薑

桂心 各一 栝婁根 六分 右七味治下篩食後溫服方寸七日三以四肢習習為度不知稍加之令

人安穩不覺膿自潰即著如平復神良此殷浩仲堪方隋濟閭黎名為神散治癰腫即消 癰疽及諸邪

腫已潰皆服之

〔行義〕癰腫不潰良由氣血虛寒雖用野葛栝婁助王不留行不得薑桂當歸之辛溫不能腐化成膿

又忍津氣渙散故預為地步而用龍骨以斂精血度幾膿成之後肌肉易生然野葛皮大毒用者宜慎

因與金匱之王不留行散絕不相類故特標殷仲堪方云

內補散 治癰疽發背婦人乳癰諸癰未潰者便消不消者令速潰疾愈方 木占斯 人參 乾薑 云一

乾地桂心 細辛 厚朴 敗醬 防風 栝婁根 桔梗 甘草 各一 右十一味治下篩酒服方

寸七約八咽覺流入瘡中若癰疽灸之不能發壞者可服之未壞者去敗醬已發膿者內敗醬服約日

七八夜二三以多為善若病在下當服血出此為腸癰也病在裏痛者服此即不痛長服治諸瘡及疽痔已潰便早愈醫人不知用此藥發背無有治者若始覺背上有不好處而渴者即勤服之若藥力行覺渴止便消散若雖已壞但日夜服勿住約腫自消散不覺欲長服者當去敗醬婦人乳癰宜速服此

一方無桂心名木占斯散主癰疽堅結若已壞者速愈未壞者使不成癰使消張文仲無桂心劉涓子云此是華佗方

衍義 木占斯是樟樹上寄生得樟辛香寒鼠之性故能消腫瘍外內諸毒入口便覺流入瘡中惜乎

世所罕得與薑桂細辛同為散結之品位以敗醬厚朴排膿泄滯防枯枯婁透表除煩人參甘草助諸

解毒之功散堅約中獨敗醬排膿為內癰之專藥故云未壞者去敗醬已發膿者內敗醬

排膿內寒散 治大瘡熱退膿血不止瘡中肉虛疼痛方 防風 茯苓 白芷 桔梗 連志 甘草

人參 芎藭 當歸 黃芪略 厚朴 桂心二分 附子二枚 赤小豆五粒 右十四味治下

篩酒服方寸匕三夜一

行義 血氣虛寒不能排膿外泄故用桂附參芪助諸味以祛蘊積之毒也

豬蹄湯 治癰疽發背方 猪蹄一具治 黃芪 黃連 芍藥各三兩 黃苓二兩 薔薇根 狼牙根各八兩

右七味咬咀以水三斗煮猪蹄令熟澄清二斗下諸藥煮取一斗去滓洗瘡一食頃以帛拭乾貼生肉

膏日一如痛加當歸甘草各二兩○又方 治癰疽發十指或起膀胱及發背後生惡肉者方 猪蹄具

治如當歸 芎藭 芍藥 大黃 黃苓 獨活 莽草各一 右八味咬咀以水三斗煮猪蹄取八

升去之內諸藥取四升去滓清瘡兩食頃洗拭乾傅麝香膏

行義 猪蹄前湯洗敗腐膿膿專取氣血之味以和血氣之滯也 前方以瘡口新肉不生恐生蠱

蟲故用狼毒後方以惡肉不犯恐犯以犯故用莽草餘則清熱和營之類助長而已

麝香膏 治癰疽及發背諸惡瘡去惡肉方 麝香 蘭茹一兩 雄黃 礬石略 右四味治下篩以

諸膏調和如泥塗之惡肉盡生却傅生肉膏

食惡肉膏方 大黃 芎藭 莽草 真珠 雌黃 附子生用各兩 白斂 礬石 黃芩 蘭茹各二兩

黃半兩 石十一味 咬咀以猪脂一升半前五六沸去滓內蘭茹礬石末攪調傅之瘡中惡肉盡乃止

治癰腫惡肉不盡者方 薊根灰 石灰別煨作灰 右二味各淋取汁合煎如膏膏成傅之食惡肉亦去

黑子此約過十日不中用○又方 生地黃汁煎如膠作餅子貼之日四五度

漆頭蘭茹散 食惡肉散方 漆頭蘭茹 硫黃 丹砂 麝香 馬齒礬 雄黃 雌黃 白礬各二兩

右八味治下篩以粉之吮食惡肉其方傳貼無白礬雄黃有黎蘞云木作膏和傅之又處瘡癰疽篇無丹砂廣濟方瘡癰腫膿消瘡中有紫肉破不消以此散搽或內

白蘭茹散 蘭茹 礬石 雄黃 硫黃各二兩 右四味治下篩內瘡中惡肉盡即止不得過好肉

生肉膏 治癰疽發背壞生肉方 生地黄 一斤 辛夷 二兩 獨活 當歸 大黃 黃芩 芎藭 白芷 芍藥 黃芩 續斷略一兩 薊白 五兩 右十二味咬咀以臘月猪脂四升煎取白芷黃下之去滓

傅立瘻○又方 乾地黄 三兩 甘草 當歸 白芷 茯苓 蜀椒 細辛 芍藥 烏喙生用 蛇銜 蛇銜生肉膏 治癰疽金瘡敗壞者方 蛇銜 當歸各六兩 乾地黄 三兩 黃連 黃芩 黃芩 大黃

續斷 蜀椒 芍藥 白芷 芎藭 莽草 白芷 附子 甘草 細辛各一兩 薊白 一把 右十八味咬咀酢漬二宿以臘月猪脂七升煎三上三下酢盡下之去滓取傅日二夜一崔氏有大戟獨活各連續斷白芷芍藥

行義 癰疽傳藥總以解毒利竅去腐生新為主如麝香膏膏取麝香利竅蘭茹破血雄黃解毒礬石去腐也 食惡肉膏即以附子散堅大黃解毒莽草祛風風從竅泄可無取於利竅耳 癰腫惡肉專取薊根治骨間諸痹拘急石灰治癰瘍惡瘡死肌炭灰亦能散火毒風腫而無石灰之烈 單用生地黃汁熬膏但能和血之痛而無去腐之功 食惡肉散中硫黃即煎食惡肉膏中附子之意不獨散堅

去腐也 食惡肉膏即以附子散堅大黃解毒莽草祛風風從竅泄可無取於利竅耳 癰腫惡肉專取薊根治骨間諸痹拘急石灰治癰瘍惡瘡死肌炭灰亦能散火毒風腫而無石灰之烈 單用生地黃汁熬膏但能和血之痛而無去腐之功 食惡肉散中硫黃即煎食惡肉膏中附子之意不獨散堅

黃汁熬膏但能和血之痛而無去腐之功 食惡肉散中硫黃即煎食惡肉膏中附子之意不獨散堅

黃汁熬膏但能和血之痛而無去腐之功 食惡肉散中硫黃即煎食惡肉膏中附子之意不獨散堅

黃汁熬膏但能和血之痛而無去腐之功 食惡肉散中硫黃即煎食惡肉膏中附子之意不獨散堅

黃汁熬膏但能和血之痛而無去腐之功 食惡肉散中硫黃即煎食惡肉膏中附子之意不獨散堅

黃汁熬膏但能和血之痛而無去腐之功 食惡肉散中硫黃即煎食惡肉膏中附子之意不獨散堅

黃汁熬膏但能和血之痛而無去腐之功 食惡肉散中硫黃即煎食惡肉膏中附子之意不獨散堅

黃汁熬膏但能和血之痛而無去腐之功 食惡肉散中硫黃即煎食惡肉膏中附子之意不獨散堅

黃汁熬膏但能和血之痛而無去腐之功 食惡肉散中硫黃即煎食惡肉膏中附子之意不獨散堅

傳生肉膏然恐餘毒未盡故於祛風和血藥中兼用大黃雖白以泄毒散腫為務 敗久不斂須防風
毒乘虛復生惡肉非用烏喙之烈蛇銜之鼠不能破宿生新 蛇銜生肉膏中附子即前方烏喙之意
蛇銜去風不逮更加之以莽草附子最堅不逮更加之以蜀椒然惡遺熱為患故配之以冷連大黃合
九方觀之去腐生新之法了無餘蘊矣

五香湯 治熱毒氣卒腫痛結作核或似癰瘡而非使人頭痛寒熱氣急者數日不除殺人方 青木香
藿香 藁陸香 沉香 丁香 各二
傳腫上 千金翼以麝香代藿香 右五味咬咀以水五升煮取二升分三服不瘥更作并以滓

行義 此於五香連翹湯中除去已下等味又以藿香易去麝香彼治久積惡毒非藉麝香不能透經
達竅此治熱毒卒腫專取藿香開發時行不正之氣病之新久不同於此可見
漏蘆湯 下之方 漏蘆 白芨 黃芩 麻黃 白薇 枳實 升麻 芍藥 甘草 各二 大黃 三

兩 右十味咬咀以水一斗煮取三升分為三服快下之無藥處單用大黃亦得 時後云治癰疽丹
生痔瘡若熱盛者可加芒硝二兩經心錄無白薇作知母犀角芒硝各二兩
行義 此與嬰孺門方大同小異彼用白薇連翹此用白芨白薇並佐麻黃以泄肌表之熱但彼用芒

硝佐大黃以滌臟腑之熱此用芍藥佐大黃以收營血之散散中寓收之法與并力峻攻稍有權度於
中
丹參膏方 丹參 薊龍 莽草 蜀椒 躑躅 各二 秦艽 獨活 白芨 牛膝 菊花 烏頭 防

己 各三 右十二味咬咀以醋二升漬一宿夏半日如急用便煎猪脂四升煎令醋氣歇慢火熬去滓
用傳患處日五六度 時後云用防風不用防已治惡肉惡
行義 丹參膏雖云散血消腫而實外傳毒風之峻藥

小竹瀝湯 治氣痛方 淡竹瀝二升 射干 杏仁 獨活 枳實 白木 防已 防風 秦艽 芍

藥 甘草 茵芋 茯苓 黃芩 麻黃略二 石十五味咬咀以水九升煎取半下竹瀝取三升分

四服

衍義 此與腳氣門中竹瀝湯等方葯味彷彿但彼用附子純麻黃以開痹者之邪此用射干純麻黃

以消壅腫之毒更一主帥而三軍聽令矣

白薇散方 白薇 防風 射干 白木略六 麻黃 秦艽 當歸 防已 烏頭 青木香 天門冬

枳實 獨活 姜豉 山茱萸略四 柴胡 白芷略三 莽草 蜀椒略二 右十九味治下節以漿

水服方寸七日三加至二七

衍義 白薇散中祛風去表之味居多兼取當歸天門冬姜豉和血通津之味以滋風燥之性獨山茱

萸一味人但知補肝膏精之用不知本經原有心下邪氣寒熱溫中逐寒溼痹去三蟲諸治惟千金得

之

葵藜散 治氣腫痛方 石用葵藜子一升熬黃為末以麻油和如泥炒令焦黑傅故熟布上如腫大小

勿開孔貼之無葵藜以赤小豆為末和雞子白如前傳乾即易妙

衍義 葵藜專祛腎經毒風千金取治氣腫本經原有治惡血積聚喉痺乳難久服長肌肉明目輕身

諸治赤小豆亦能散血解毒故可代用

藜蘆膏 治赤色腫有尖頭者方 藜蘆二分 黃連 礬石 雄黃 松脂 黃芩略八 石六味為末

以猪脂三升煎令鉅調和傅上癰癰頭瘡極效又治淺瘡經年抓搔瘡處成孔者

衍義 腫尖色赤明是陽毒燦發故以祛熱解毒為務

瞿麥散 治癰排膿止痛利小便方 瞿麥一兩 芍藥 桂心 赤小豆酒浸 麥門冬 芫花 黃芩

當歸 白斂略二 石九味為末先食酒下方寸七日三諸方有細辛或仁白芷不用桂心麥門冬白斂治

行義 癰疽之邪頭內外開泄以平且毒氣元氣不充大便不實又當從滲通分解毒故此方專取瞿麥小豆門冬通泄化引邪氣前歸芍并連勝乾桂心為熱邪之嚮導黃芪白斂方為外拓不使其毒內細已潰未潰無不使宜

黃芪仁散 治癰疽方寸七日三夜二 黃芪仁 桂心 白斂 當歸 茯苓 乾薑 右六味治

下節先食溫酒服方寸七日三夜二

行義 此因元氣不充腫脹已入不能起發故用黃芪桂枝助陽當歸和血白斂解毒意故仁通筋脈

毒邪退熱之聖藥也

黃耆扶令湯 治癰疽清後膿太多虛熱方 黃芪 麥門冬 生薑 五味子 茯苓 桂心 炙甘草 右八味咬咀以水一斗半煮取四升分六服 黃耆 茯苓 桂心 炙甘草 右八味咬咀以水一斗半煮取四升分六服

行義 清後津血即傷毒邪未艾故宜和血滋津為務元氣虛其當從翼方尤勝

內消散 治凡是癰疽皆宜服之方 赤小豆 人參 甘草 瞿麥 當歸 猪苓 黃芪 白斂 黃耆 防風 升麻 右十二味治下節以酒服方寸七日三夜二長服取

瘰癧 升提補托和血益氣清熱利水解毒七法畢具本虛而毒邪向衰者宜之

行義 升提補托和血益氣清熱利水解毒七法畢具本虛而毒邪向衰者宜之

附子 桂心 當歸 續斷 乾薑 蜀椒 藁本 厚朴 右十一味治下節空腹以酒

服方寸七日三夜二加斑蟊七枚益良

行義 瘰癧蜂房逐垢之品椒薑桂附破結之屬當歸調血續斷和傷藁本祛邪厚朴泄滯地榆止痛

人但知地榆止下部血不知本經原有乳產瘡瘍之傷五漏除惡肉療金瘡之治所以癰疽痔漏俱得

用之專佐瘰癧蜂房除瘰癧也

瘰癧蜂房逐垢之品椒薑桂附破結之屬當歸調血續斷和傷藁本祛邪厚朴泄滯地榆止痛

人但知地榆止下部血不知本經原有乳產瘡瘍之傷五漏除惡肉療金瘡之治所以癰疽痔漏俱得

用之專佐瘰癧蜂房除瘰癧也

凡患腫腎因宿熱所致須服冷藥遲後有患冷利不止者方人參 龍骨 赤石脂 甘草 乾薑二

兩附子一枚 右六味咬咀以水八升者取二升半分三服

〔衍義〕熱毒燉發服涼藥得已消散但中氣受傷變成冷痢故以溫中固脫為之急需

梔子湯 治表裏俱熱三焦俱實身體生瘡及發癰癤大小便不利方 梔子仁 枳 芒硝 二兩 黃芩

甘草 知母 兩各二 大黃 四兩 右六味咬咀以水五升者減半下大黃取一升八合去滓內芒硝分三

服

〔衍義〕此治內外俱實故用硝黃瀉利梔知分清黃芩解熱甘草和中而解諸毒世本方下誤註云三

焦不實安有三焦不實而用峻攻之理

五利湯 治年四十已還強壯常大患執發癰疽無定處大小便不通方 劉涓子名 芒硝 一兩 升麻

黃芩 兩各二 大黃 三兩 梔子仁 五兩 右五味咬咀以水五升煮取二升四合去滓下芒硝分四服快利

即止

〔衍義〕於前方中除去知母甘草而易升麻升舉清陽於上硝黃瀉熱毒於下黃芩梔子兼清表熱

從滲道而泄也

乾地黃丸 凡壯熱人能長服之終身不患癰疽令人肥悅耐勞苦方 乾地黃 五兩 芍藥 甘草 桂

心 黃芪 黃芩 連志 兩各二 石斛 當歸 大黃 兩各三 巴戟天 括婁根 人參 兩各一 天門冬 從

蓉 兩各四 右十五味為末蜜丸如桐子大酒服十九日三加至二十丸

〔衍義〕無故脈數須防發癰令見肌常壯熱洵是壯火憑陵之象故以地黃黃芩石斛括婁清熱劑中

兼進人參天冬以滋津液口乾從蓉以攝虛陽黃芪甘草以固衛氣當歸芍藥以和營血桂心連志開

導伏火大黃瀉除宿熱寓補於瀉而用人參黃芪佐大黃黃芩祛熱已足舉世所昧至用巴戟從蓉助

桂心連志通腎即先哲方中罕具此法蓋腎氣一通熱邪從二便開泄矣

又方 治虛熱消瘕癰方 乾地黄^{四兩} 大黃^{六兩} 芍藥 王不留行 茯苓 甘草 遠志 麥門冬

人參 升麻 黃芩^{各三兩} 桂心^{六兩} 石十二味^{為末蜜和丸}如梧子大酒服十九日三加至二十

九久服令人肥健 一方有枳實三兩^{外臺無甘草遠志麥}

行義 前方為中寓補此方為中寓升即於前方除去歸芪從武石斛栝婁而易升麻開提上竅王不

留行分利下竅茯苓佐桂心通調於下麥門冬佐人參數化於上上下氣化宣通熱解津四何有虛熱

之患乎

又方 治虛勞客熱數發癰腫瘡癰經年不除方 乾地黄^{四兩} 黃芩 黃苓 大黃 黃連 澤瀉

細辛^{各三兩} 甘草 桂心 芍藥 茯苓 乾漆^{各二兩} 人參 一兩 天冬^{五兩} 右十四味為末蜜丸如梧

子大酒服十九日三夜一加至二十九久服延年終身不發癰疽凡方中用大黃薄切五升米下蒸熟

曝乾用之款多倍大黃^{要藉喻義不用澤瀉}

衍義 此方專治癰熱即於乾地黄丸中採取九味而加乾漆以破癰黃連以祛熱其細辛澤瀉即第

二方中升麻茯苓之意三方大黃總藉人參助於連桂心助地芍之力

地黃煎 補虛除熱散乳巖毒癰瘡痔疾悉宜服之方 生地黄隨多少三搗三壓取汁令盡銅器中湯

上煮勿益覆令泄氣得減半出之布絞去粗滓再煎令如餲丸如彈丸許酒服日三勿加百日癰疽永

不發

枸杞煎 治虛勞輕身益氣令人有力一切癰疽永不發方 枸杞三十斤剉葉生至未落可用莖葉落

至未生可用根以水一石煮取五斗去滓浚將滓更入釜與水依煎者取五斗并前浚清去滓釜中煎

取二斗許更入小銅鍋子煎如飴止或器盛重湯煮更好每日服一合半日再漸加

治風溼體痛不能飲食癰疽後補虛羸方 薔薇根 枸杞根^{各一斤} 生地黄 食蜜^{各十斤} 右四味咬

咀先以水煮二根令味濃取二斛去浚次內地黃煮令爛絞去滓微火煎令如粥次內蜜和令相得每

食後服如彈丸許

衍義 地黃煎專滋血中伏熱 枸杞煎專治三焦伏火二方分主不可移易 又以枸杞地黃分解

氣血中伏火并取薔薇營解熱毒於上收攝津氣於下蜂蠶解毒清熱於中而於喉舌請證尤宜

搗腫方 大黃 黃芩 白斂 芒硝各三 右四味咬咀以水六升煮取三升以故帛四重蘸汁中以

搗腫處乾即易之無度數晝夜為之○又方 青木香 犀角 大黃 梔子仁 紫檀香 升麻

黃芩 羚羊角 黃連 甘草 芒硝 射干 黃柏 白斂各二 地黃汁各五 麝香研入 右十六

味以咀以水五升煮取二升少令以故帛兩重蘸湯中搗腫處乾即易之日夜數百度

衍義 搗腫用芩斂硝黃清解熱毒葯雖苦寒倍湯之熱熱因寒用可無礙滯熱毒之患 癰疽始發

焮赤長速熱毒之勢巨測故於清火解毒劑中借青木香以開凝結紫檀香以破血腫麝香以散凝隊

之毒也

又方 治頸項及胸背有大腫赤發即封之令不成膿方 朴硝五兩 香豉 生地汁各半 右三味合

搗煮令地黃爛軟傅腫處厚二分日三四易至瘡止此兼治一切腫

衍義 腫赤發於頸項胸背熱邪乘風氣焮發故於朴硝地黃攻解血熱劑中藉香豉以祛風熱之毒

也

又方 治癰腫痛煩悶方 用生楸葉十重貼之以帛裹令緩急得所日二易止痛兼消腫蝕膿甚良勝

於他物如冬月先收乾者臨用時以鹽潤之亦可薄削楸皮用之○又方治大人小兒癰腫方 用生

猪腦子傅紙上貼之乾則易之日三度○又方 芥子為末湯調傅紙上貼之干金翼以猪胆和塗之○又方

白薑為末蒜和搗傅上○又方 搗馬鞭草傅上即頭出

衍義 灸而足大拇指奇中立瘡仍隨病左右 芥子破結開痂 馬鞭草和血消腫以

上五方主治彼分不可混用

治癰始覺腫令消方 大黃 通草 葶藶 莽草 各等 右四味為末以水和傳上乾則易之○又方

以葶藶末三指撮水和服之日三神良

治癰方 以羌花為末膠和如粥傅之

治癰疽發背陰處通身有數十癰者方 取乾牛屎燒灰治下篩以雞子白調塗之乾復易

若已結膿便聚長方 括婁根為末苦酒和傅燥復易亦小豆亦佳

治癰有膿令潰方 用雞羽三七枚燒末服之即潰○又方 人乳和麴傅上比曉膿血盡出不用手近

治癰腫發背初作及經十日已上腫赤焮熱毒氣盛日夜疼痛百約不收方 鰕雞子一枚 新出狗屎如雞子

餅子熱即易勿令轉動及歇氣經一宿定如多日患者三日貼之一日一易至瘥止此方穢惡不可施

之貴勝然其愈疾一切諸方皆不可及自外諸方還復備員設儀註而已學者當曉此方以備諸急爾

行義 始腫令消用葶藶通草及葶藶羌花牛糞雞子等方總不若鰕雞子狗屎之效速觀方後云此

方穢惡不可施之貴勝等語已自為註脚

烏麻膏 治諸癰瘡一十三般丁腫五色游腫癰癤毒熱狐疝蛇毒狂犬蟲狼六畜所傷不可識者二

十年漏金瘡中風皆以此膏貼之惡膿盡即瘥止痛生肌一帖不換藥惟一日一度拭去膏上膿再貼

至瘥止 生烏麻一 黃丹四兩 蠟四分 右三味以臘日前一日從午內油銅器中微火煎至明旦

香油減一分下黃丹消盡下蠟令沫消約成至午時出惟男子合之母令小兒女子六畜等見

治諸腫貼方 紫葛十分 大黃五分 青木香一分 元參 白斂 黃芩 黃連 榆白皮 升麻 由跋

各三 赤小豆一合 右十一味治下篩以生地黃汁和如泥傅腫上乾則易無地黃汁以米醋和之

松脂膏 治癰腫方 松脂半斤 猪脂半合 黃芩 黃連 黃耆 大黃 當歸 芍藥 芎藭 蠟各

九

右十味咬咀合二脂微火煎三上三下綿絞去滓火炙傅紙上隨腫大小貼之日易即瘥○又方

松脂一斤 猪脂半斤 白蠟四兩 大黃兩 黃芩 黃連 黃柏 當歸 芍藥 芫花 細辛 白芷 防風 莽草 白飯兩半 右十五味咬咀先煎二脂白蠟令烊次內諸藥煎三上三下以綿及

布絞著水中為餅取少許火炙之傅油紙上貼瘡處異方有黃

青龍五生膏 治癰疽痔漏惡瘡膿血出皆以此方導之 生梧桐白皮 生桑白皮 生柏白皮 生

青竹茹 生龍胆草各五兩 蜂房 猬皮 蛇蛻皮 雄黃 雌黃各一兩 蜀椒 附子 芫花各半 右

十三味咬咀以三年苦酒二斗浸一宿於炭上炙乾搗下細篩以猪脂二升半微火煎攪令相得如飴

以新白磁器盛著水中隨病深淺傅之并以清酒服如棗核大日一

治癰疽痔漏惡瘡婦人如乳漆瘡方 野葛 芍藥 薤白 當歸 通草各二兩 附子一枚 右六味咬

咀酢浸半日先煎猪脂八合令煙出內亂髮一分令消盡下之待冷又內松脂八分蠟二分更著火上

和次內諸藥煎令沸三上三下去滓以故帛傅約貼腫上乾即易如春月去附子其髮須洗盡垢不爾

令瘡痛 滅癰骨 治諸色癰腫惡瘡瘥後有癰痕方 安息香一作礬石 狼毒 羊躑躅 烏頭 附子 野

葛 白芷 烏賊骨 皂莢 天雄 芍藥 芫花 赤石脂 大黃 當歸 莽草 石膏 乾地

黃 地榆 白木 續斷 鬼白 蜀椒 巴豆 細辛各一兩 右二十六味搗末用成煎猪脂四斤

和煎三上三下以好鹽一大匙下之膏成須服者與服須摩者與摩勿近日處忌妊娠人若滅癰以布

指令傷傳之若鼻中息肉取如大豆內鼻中如瘰癧者酒服如棗核大痔漏者以綿裹如梅子大內下

部中風者厚患上取瘡中亦內之其滅癰取少許和麝屎白傳之取蠟日合之神效異方有麝

治膿潰後瘡不合方 燒鼠皮一枚為末傅瘡孔中○又方 熟嚼大豆傳之○又方 炒烏麻令黑熟搗

傳之○又方 牛屎傳之乾即易○又方 燒破蒲席成臘月猪脂和內孔中

治癰久不瘥方 用馬齒莧搗汁煎傳之

治癰 潰後膿不斷及為諸物刺傷瘡不瘥方 石硫黃粉 右一味取 一莖槌碎頭少溼內硫黃中

以刺瘡孔瘡瘻為度

治癰肉中如眼諸藥所不效者方 取附子削令如碁子安腫上以唾貼以火炙之令附子欲焦復唾溼

以火灸之如是三度令附子之熱氣徹內即瘥此法極妙

練石散 治癰有堅如石核者復太色不變或作石癰方 粗理黃石 一斤 鹿角 半斤 白飯 三兩 右三

味以醋五升燒石赤內醋中不限數以醋減半止細搗末以餘醋和如泥厚傳之乾即易取消止盡更

合諸漏及瘰癧止藥悉皆用之仍火鐵鐵頭 傳藥又單磨鹿角半夏末和傳之不如前方佳也

治石癰堅如石不作膿者方 生商陸根熟搗傳之乾即易取軟為度又治溼漏諸癰癰 又方 蜀桑

根白皮陰乾搗末煑膠酒和藥傳腫根即拔 又方 莨菪子為末醋和傳瘡頭即拔 又方 蛇蛻

皮貼之經宿便瘥 又方 櫟子一枚以醋於青石上磨之以塗腫上乾更塗不過十度即愈 又方

梁上塵 葵根莖灰 等分 右二味以醋和傳之即瘥 又方 當上灸百壯石子當碎出如不出

益壯數乃佳 凡發腫至堅有 根者名白石癰 治諸腫貼方及松脂膏兩方青龍五生膏俱拔毒外出 治

行義 烏麻膏藥品減略而功用頗專 治諸腫貼方及松脂膏兩方青龍五生膏俱拔毒外出 治

疽痔瘻瘡與滅癰膏並用野葛大毒僅可外用服食宜慎 膿潰後用鼠皮大豆烏麻蒲灰馬齒莧皆

解毒和血之品 潰久瘡口不斂用硫黃附子專化歹肉 石癰用練石散商陸莨菪等方專破堅結

然須諒病人虛實取用 治惡毒腫或者陰卵或者一邊疼痛掣急引小腹不可忍者一宿殺入方 取茴香草搗汁飲一升日

三四服澤傳腫上冬月開生者根亦可引小腹及腰髀痛方用桃仁一升研以酒三升攪和頓服之厚衣被蓋令汗

治風勞毒腫疼痛掣急或牽引小腹及腰髀痛方用桃仁一升研以酒三升攪和頓服之厚衣被蓋令汗

十

不過三劑瘥

治脚腫向上至腹即殺人者方

用赤小豆一斗以水三斗煮令爛出豆以汁浸脚至膝每日一度瘥止

若已入腹不須浸但煮豆食之忌鹽菜米麵等渴飲汁瘥乃止

麻子小豆湯

治毒腫無定處或赤色惡寒或心腹刺痛煩悶者此是毒氣深重所致方

麻子 赤小

豆各五生商陸

附子二兩射干三兩升麻四兩

右六味以水四斗先煮四味取二斗半去滓

次研麻子碎和汁煮一沸濾去滓取汁爛煮豆其汁每服五合日二夜一當利小便為度腫退即瘥并

食豆

治一切腫毒疼痛不可忍方

取單麻子熟搗傅之即瘥

治諸瘡著白痴復發方

大蒜 鼠屎 香墨等分 右三味為末傅之日三

治癰子方

凡癰無頭者吞葵子一枚不得多服○又方 生椒末 釜下土等分

右二味為末醋和

塗之

○又方 狗頭骨 芸臺子等分

右二味為末醋和傅之○又方 以鼠粘根葉貼

之○又方 雀屎水和傅之○又方 燒葛蔓灰封上自消牛糞灰封之亦佳

行義

茴香治陰之腫 桃仁治瘀血腫 赤小豆治溼熱脚腫 麻子小豆治寒熱遊走無定之腫

單麻拔毒

蒜墨鼠屎消腫 葵子刺殺 椒末破陰 狗頭骨芸臺子暖腎 葛蔓灰封腫 鼠

粘葉貼瘡雀屎滅癰各審其因而用之

發背第三論一首 方十五首

論曰凡發背皆因服食五石寒熱更生散所致亦有單服鍾乳而發者有上世服之者其候率多於背兩

胛間初起如粟米大或痛或癢仍作赤色人初不以為事日漸長大不過十日遂至於死其臨困之時已

潤三寸高一寸瘡有數十孔以手按之諸孔中皆膿出尋時失音所以養生者小覺背上癢痛有異即火

急取淨土水和如泥捻作餅子厚二分闊一寸半以粗艾大作炷灸泥餅上貼著瘡上灸之一炷一易餅

子若粟米大時可灸七餅即瘥如榆莢大灸七七餅炷即瘥如錢大可日夜灸之不限炷數仍服五香連翹湯方見本卷及鐵漿諸藥攻之乃愈又法諸發背未作大膿可以冷水射之浸石令冷熨之日夜不住瘥止此病忌麵酒五辛等亦有當兩肩上發者○凡服石人皆須勞後四體無令自安如不爾者多有發動亦不得遂便恣意取暖稱已適情必須遺欲以取寒凍雖當時不寧於後在身多有所益無發動之慮耳○凡腫起背胛間頭白如黍粟四邊相連腫赤黑令人悶亂即名發背也禁房室肉酒麵蒜若不灸治即入內殺入若灸當瘡上七八百壯有人不識多作雜治者皆死

治發背及癰腫已潰未潰方 用香豉三升少與水和熟搗成如薄泥依腫作餅子厚三分已上有孔勿覆孔中布豉餅以艾列其上灸之使溫溫而熱勿令破肉如熱痛即急易之患當減快得安穩一日二度灸之如先有瘡孔孔中得汁出瘥

衍義 發背一證膏梁藜藿逆順天淵膏梁之變總不出約石燂焊五辛雜陳嗜欲不節受如持虛毒從內發非藜藿六氣暴感之比貴在辨治之早可以轉逆為順其泥餅灸取純陽艾火以導毒邪之火五香連翹湯為腫瘍始發時泄熱解毒要約不但藜藿為宜即膏梁素豐本虛毒盛亦可急奪以衰其勢鐵漿鎮攝龍雷之火下氣最速然腎虛者恐非所宜膿成咸為切禁射水漬石取寒凍身在西北所稟剛毅可以效用東南水土孱弱尤難效尤香豉善解腎臟伏匿之邪藉艾火引之外泄與泥餅灸差有分別

治癰疽發背已潰未潰及諸腫毒方 栝萸根 榆白皮 胡燕窠 鼠竈土各等 右四味為末以女

人月經衣水洗取汁和如泥封腫上乾即易潰者四面封之已覺即封從一日至五日令瘥

衍義 栝萸根解毒排膿本經有安中補外續絕傷之功榆白皮滑利通竅本經滑利水道除邪氣之

用胡燕窠拔毒去溼鼠穴上通腎達竅更以經衣洗水和封取陰經敗穢之餘以導陰邪敗穢之毒

治發背背上初欲結癰方 大黃 升麻 黃芩 甘草各三 梔子七 右五味咬咀以水九升煮取

三升分二服取快利便止不利更進

衍義 苦寒下利約中但取升麻一味引領諸藥自上達下以泄其邪深得本經辟瘟瘧瘴氣邪氣盡毒之旨在於藜蘆尤為相宜

內補散 治癰疽發背已潰排膿生肉方 當歸 桂心各二兩 人參 芍藥 厚朴 防風 甘草 白芷 桔梗各一兩 右九味治下篩酒服方寸七日三夜二未瘳更服勿絕外臺無防風

衍義 本氣虛寒之人雖熱邪固結非助以溫補不能化毒成膿芍藥歸參桂心補托於內防 甘桔通達於外厚朴內外兼通以散結滯之氣此膏粱養者宜之

又方 治癰疽發背方 蜀椒 乾薑 黃芩 人參各二兩 桂心 一分 白斂 甘草 附子 防風各四兩 芍藥二兩 小豆一合 右十一味治下篩酒服方寸七日三夜二

衍義 前方治脾胃之虛此方治脾腎之虛椒薑桂附破結於內苓斂防甘解散於外人參芍藥溫補氣血以排膿小豆一味通調水道以瀉火合心包之毒從小腸膀胱開泄也

李根皮散 治癰疽發背及小小瘰癧方 李根皮二升 桔槩根半夏 通草 白斂 桔梗 厚朴 黃芩 附子各一兩 甘草 當歸各二兩 葛根三兩 桂心 芍藥各四兩 芍藥六兩 右十五味治篩酒服方寸七日三瘡大困者夜再服之曾有人患骨從瘡中出兼有三十餘癰癰服此散瘳

衍義 甘李根皮苦鹹降逆枯槩葛根清胃解毒通草白斂散結利數厚朴半夏破氣滌痰桂心附子化堅排膿芍藥當歸芍藥和營止痛甘桔黃芩清熱利氣瘍潰本虛而膿未遠者為宜

大內塞排膿散 治發背癰腫經年瘳後復發此因大風或結氣在內經脈閉塞至夏月已來出攻於背久不治積聚作膿血為瘡內漏方 山茱萸 五味子 茯苓 乾薑各六兩 甘草 石斛 人參 桂心 芍藥各五兩 巴戟天 麥門冬 乾地黄 肉苁蓉 遠志各一兩 當歸 石葦 芍藥各四兩 附子二分 地膽 兔絲子各二兩 右二十味治下篩酒服方寸七日三夜一稍加之長服終身不患癰癰

衍義 癰腫久敗不瘥或瘥後復發而成內漏總由中氣告匱氣血乖離不能化腐生新所致故於溫補腎臟氣血藥中專賴地膽之破血攻毒石葦之疎泄旺氣然後溫補諸藥得以建內塞之功寓瀉於補之妙用惟千金得之

治發背方 用亂髮灰酒服方寸七亦治瘰癧○又方 猪脂傳上日四五度亦治乳發救急方云取猪初貼大證即寒寒定好眠甚妙○又方 三年醋滓微火煎令稠和牛脂傳上○又方 猪狗牙燒

灰醋和傳上日三四易○又方 燒古蚌灰以雞子白和傳之日三易○又方 飲鐵漿二升取利本

論○又方 蛇頭灰醋和日三易○又方 燒鹿角灰醋和傳之日四五易

衍義 髮灰散血利竅 猪脂涼血解毒 醋滓羊脂微腫解毒 狗牙搜逐腎邪 蚌灰難清解散

肝熱 鐵漿下氣除熱 蛇頭灰以毒攻毒 鹿角灰溫散瘀結審其宜而採用可也

丹毒第四論一首方三十八首

論曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗之色大者如手掌甚者遍身有瘡有腫無定色有白丹者肉中

腫起瘡而腹痛微虛腫如吹狀癰疹起也有難冠丹者赤色而起大者如連錢小者如麻豆粒狀肉上粟粟

如雞冠肌理也一名茱萸丹有水丹者由遍體熱起遇水溼搏之結丹晃晃黃赤色如有水在皮中喜著

股及陰處此雖小疾不治令人至死

升麻膏方 升麻 白薇附後作 漏蘆 連翹 芒硝 黃芩各二兩 蛇銜 枳實各三兩 胡蘆 梔子十四

枚 石十味微搗以水三升浸半日以猪骨五升煎令水氣去滓膏成傳上諸丹皆用之及熱瘡腫上

日三經心錄無枳實 以治諸毒腫

衍義 升麻引諸藥外達皮肉和以猪脂滋其血氣而毒自化矣

升麻湯 治丹毒方 升麻 漏蘆 芒硝各二兩 黃芩三兩 胡蘆五兩 梔子二十枚 右六味咬咀以水一

斗浸良久煮取七升冷以故帛染汁搗諸丹毒上常令其溼搗後須服飲并漏蘆湯方並見前癰腫條

中服之立瘥小品用治丹瘡諸毒腫

行義 即前升麻膏中六味煮沸汁搗腫亦可內服以分其勢與漏蘆湯約雖不同而功用彷彿

丹方 水荅 生見銜 生地黃 生松菜即芸薹 薤葉 慎火草 五葉藤 豆葉 浮萍 已上取

一味單搗塗之 大黃 梔子 黃芩 芒硝 已上取一味下水和用 右十三味或搗成末單用

一味立瘥

行義 丹方一十三種皆涼血解毒之品可隨證取用惟芸苔為游風丹腫專約無葉時以子代之

又方 凡天下極冷無過於藻菜但有患熱毒腫并丹等取渠中藻菜細切熟搗傅之厚三分乾即易

治諸丹神驗方 以芸苔菜熟搗厚封之隨手即消如餘熱氣未愈但三日內封之瘥止縱乾亦封之不

歇以絕本余以貞觀七年二月八日於內江縣飲多至夜睡中覺四體骨肉疼痛至曉頭痛目眩額左

角上如彈丸大腫痛手不得近至午時至石角至夜諸處皆到目遂閉合不得開幾致殞斃縣令周公

以種種藥治不瘥經七日余自處此方其驗如神故疏傳之以來世云耳

治五色油丹方 俗云油腫若犯者多致死不可輕之 縛母猪枕頭卧甚良○又方 牛屎塗之乾即易

治赤流腫丹毒方 取榆根白皮為末雞子白和傅翼方又用雞子白和傅○又方 搗大麻子水和傅之○又

方 前羊脂摩之得青羊脂最良鼻外狀不治日劇遍身即殺人也

治小兒丹毒方 搗馬齒莧一握取汁飲以滓傅上○又方 搗赤小豆五合水和取汁飲一合良滓塗

五心○又方 濃煮大豆汁塗之良瘥後亦無痕○又方 臘月猪脂和釜下土傅之乾即易

治小兒五色丹方 用猪槽下爛泥傅之乾即易鼻驗治年○又方 搗胡蘿蔔葉傅之○又方 服黃龍

湯二合并傳患上佳

治小兒白丹方 燒猪屎灰以雞子白和傅之良翼云芸苔末以雞子白和塗之

治小兒赤丹方 搗芸苔葉汁服三合滓傅上良雞子白和塗之

治小兒赤丹斑駁者方 以唾和胡粉從外向內傳之○又方 銀屑以豬脂和傳之○又方 以屋塵臘月豬脂和傳之

治小兒火丹赤如朱走皮中方 以醋和鼓傳之○又方 鯉魚血傳之良○又方 搗仔子傳之○又方 猪尿水和絞取汁服少許良

治小兒天火毒肉中有赤如丹色大者如手甚者通身或痛或癢或腫方 赤小豆二升為末以雞子白和如薄泥傳之乾即易便瘥一切丹並用此方皆瘥○又方 生麻油塗之

治小兒骨火丹其瘡見骨方 搗大小蒜厚傳之著足蹠者是

治小兒殃火丹毒著兩脇及腋下者方 用伏龍肝為末油和傳之乾則易若入腹及陰以慎火草取汁用之

治小兒尿竈丹初從兩股起及臍間走入陰頭皆赤色者 桑白皮切二升以水二升煮取汁浴之良○

又方 燒李根為灰以田中流水和傳之良

治小兒朱田火丹病一日一夜即成瘡先從背起漸至遍身如粟大正赤色者方 濃煮棘根汁洗之已成瘡者亦小豆末傳之未成瘡者雞子白和小豆末傳之

治小兒天竈火丹病自髀間起小兒未滿百日陰頭赤腫血出方 伏龍肝搗末以雞子白和傳之日三良

○又方 鯽魚肉劉玉亦小豆末三合右二味和搗少水和傳之良

治小兒野火丹病通身皆赤者方 用油塗之

治小兒菜葉丹病初從背起遍身如細纈一宿成瘡者方 用赤小豆為末以粉之如未成瘡者雞子白和傳之

治小兒廢竈火丹初從足趺起正赤色者方 以赤棗根煮汁沐浴五六度良

衍義 已上三十三方或用清解或用溫散隨證取用可也

癰疹第五 論一首 方二十九首

論曰素問云風邪客於肌中則肌虛真氣發散又被寒搏皮膚外發腠理開毫毛淫氣妄行之則為瘡也
所以有風疹搔癢皆由於此又有赤疹者忽起如蚊蚋啄煩癢極者重皆壘起搔之逐手起又有白疹者
亦如此赤疹熱時即發冷即止白疹天陰冷即發白疹宜煮薤白汁拭之或者薤白和少酒以浴之良氏
似治或者石南汁拭之良餘一切如治丹方法

石南湯 治六十四種風淫液走入皮中如蟻行腰脊強直五緩六急手足拘攣癰疹搔之作瘡風尸身
瘡卒面目腫起手不得上頭口噤不能言方見第八卷風癰篇中此方但見癰疹惡服之瘡

衍義 石南為風痺腎弱要約本經養腎氣治內傷陰衰利筋骨皮毛所以風懿走注風癰癰疹石南
湯咸為專藥單用煮汁拭之以引毒邪外出

治風癰癰疹心迷悶亂方 天雄 牛膝 桂心 知母各四分 栝萸根 白木各五分 防風六分 人參 乾
薑 細辛各三分 右十味為末酒服半錢七加至一七為度

衍義 心迷悶亂良由風火之邪上侮君主雖用防風不得天雄之悍烈不能除破風毒雖用知母不
得人參之大力不能滅化津氣其外桂心乾薑佐天雄細辛以祛風牛膝栝萸佐知母人參以化熱蓋

石南湯治風毒外注故用人參以佐麻黃此治風毒內擾故用人參以佐知母此中妙用不可不辨
治癰癰皮中風虛方 枳實 三升 松葉 切一獨活 從蓉 黃芪 秦光各四兩 丹參 各五兩 右八

味咬咀以酒二斗浸六宿每服二合日二稍加之
衍義 癰癰總由風行皮中所致是用松葉獨活秦光薤白等味須兼從蓉黃芪丹參之類所謂血行

風自滅也詳方中枳實當是枳壳之誤枳實雖有開破破氣之功不若枳殼本經有大風在皮膚如麻
豆之苦癢正合此方主治也

又方 大豆三升酒六升煮四五沸每服一盞日三〇又方 牛膝為末酒下方寸七日三升治骨祖癰

病及瘡癰○又方 芥子為末漿服方寸七日三○又方 白木為末酒服方寸七日三
治小兒患癰疹入腹體腫強而古乾方 蕪菁子為末酒服方寸七日三

衍義

大豆祛風解毒 牛膝滋津潤燥 芥子祛風逐痰 白木除風燥溼 蕪菁子解毒散腫小

方中之可採用者也

治風癢癰疹方 白木三兩 戎鹽 礬石各半 黃連 黃芩 細辛 芎藭 茵芋各二 石八味咬咀

以漿水一斗煮取三升洗之日三良○又方 馬蘭子 蒴藿 礬石 芫蔚子 蒺藜子 茵芋

羊桃 扁竹各二 石八味咬咀以漿水二斗煮取一斗二升內礬石洗之日三○又方 蒴藿 防

風 羊桃 石南 茵芋 芫花 蒺藜 礬石各一 石八味咬咀以漿水一斗煮取五升去滓內

礬石令小沸溫浴之○又方 蛇牀子二升 防風二兩 生蒺藜二兩 右三味咬咀以水一斗煮取

五升拭患上日三五遍

治癰疹癢痛方 大黃 升麻 黃柏 當歸 防風 芍藥 黃芩 青木香 甘草各二 楓香五兩

芒硝一兩 地黃汁一升 右十二味咬咀以水一斗煮取三升半去滓下芒硝令消帛染搗病上一炊

久日四五度

治準體癢痛如蟲啗搔之皮便脫落作瘡方 蒺藜子三升 蛇牀子 芫蔚子各二 大戟一斤 大黃二兩

礬石三兩 防風五兩 右七味咬咀以酒四升水七升煮取四升去滓內礬石以帛染拭之

治風癢腫瘡癢在頭面搗洗方 大黃 芒硝各一 莽草各一 黃連各一 黃芩二兩 蒺藜子五合

石六味咀咬以水七升煮取三升去滓下芒硝以帛染搗洗之日一度勿近目

治身體赤癢疹而癢搔之隨手腫起方 莽草半兩 當歸 芎藭 大戟 細辛 芍藥 芫花 川椒

附子 躑躅各一 猪膏半 右十味咬咀酒漬一宿猪膏煎之候附子色黃膏成去滓傅病上日

三

青羊脂膏 治風熱赤疹搔之隨手作瘡方 青羊脂四兩 甘草 芍藥各三兩 寒水石 白芷 白芨

黃芩 防風 黃耆 升麻各一兩 竹葉切 石膏各一升 右十二味咬咀先以水八升煮石膏竹葉取四

升去滓浸諸藥以不中水猪脂二升合煎膏成傳病上良○又方 黃連切 芒硝各五兩 右二味以水

六升者取半去滓洗之日四五度○又方 巴豆二兩以水七升煮取三升以故帛染汁拭之大人小

兒以意加減○又方 礬石二兩為末酒三升漬令消以帛染拭病上○又方 吳茱萸一升酒五升

煮取一升半帛染拭病上○又方 酪和鹽熟煮摩之隨手即消良○又方 石灰淋取汁洗之良○

又方 白芷根葉煮汁洗之

治癰疹百療不瘥者方 景天一升一名慎火草細搗取汁傳上熱灸手摩之日三度瘥

治暴氣在表攻皮上癰疹作瘡方 槐枝葉煮洗之○又方 蠶沙二升水二升煮去滓洗之良○又方

車前子為末粉之良○又方 鹽湯洗過以麥子授傅之○又方 灸曲池二穴小兒隨年壯發即灸

之神良

〔衍義〕外用諸方或搗或搗或傅或浴大抵祛風解毒為主而兼寒折溫散涼解酸收等治各有攸宜

非可一途而取即如巴豆拔毒礬石酸收石灰化腐鹽湯辟熱隨所見證而為取用可也

癰疽第六論一首十四條 方九十三首

論曰癰疽者肉中忽生點子如豆粒小者如黍粟劇者如梅李或赤或黑或青或白其狀不定有根不浮

腫痛傷之應心根深至肌經久使四面悉腫胞黯紫黑色能爛壞筋骨若毒散逐脈入臟殺入南人名

為榻者毒厚肉處即割去之亦燒鐵烙之令焦如炭或灸百壯或飲菸根汁或飲藍菁汁或犀角汁及升

麻汁竹瀝黃龍湯等諸家方治專去其熱取瘥其病喜者十指故與代指相似人不識之呼作代指不急

治亦逐脉上入臟殺入南方人得之皆斬去其指初指頭先作黯瘡後始腫赤黑黯瘡痛人心是也 代

指者先腫瘡熱痛色不黯緣小甲邊結膿劇者小皆脫落此謂之代指病也但得一物冷約汁搗清之佳

若熱盛服瀉蘆湯癰疽門及掃漬之傳升麻膏癰疽門亦可鍼去血不妨洗清塗膏也復有惡肉病

者身上忽有肉如赤豆粒突出便長堆出如牛馬乳上如雞冠狀不治自長出不止亦不痛壞此由春冬

時受惡風入肌脈中變成此疾治之宜服瀉蘆湯外燒鐵烙之日日為之令焦盡即以升麻膏傳上積日

乃瘥又有赤脈病者身上忽有赤脈絡起龍脊如死蚯蚓之狀視之如有水在脈中長短皆逐脈所處

此由春冬受惡風入絡脈中其血肉瘀所作也宜五香連翹湯癰疽門及竹瀝等治之刺去其血仍傳

丹參膏癰疽門亦用白雞屎塗之良惡核病者肉中忽有核累累如梅李核小者如豆粒皮肉疼痛

壯熱惡寒是也與諸瘡根癰癰結筋相似其瘡根癰癰因瘡而生是緩無毒惡核病卒然而起有毒若不

治入腹煩悶殺人皆由冬月受溫風至春夏有暴寒相搏氣結成此毒也但服五香湯主之癰疽門又

以小豆末傳之亦煮湯漬時時洗之消後以丹參膏傳之令餘核盡消凡惡核初似被射工毒無常定處

多側側然痛或時不痛人不痛者即不憂不憂則救遲救遲則殺人是以宜早防之尤忌食雞魚猪牛馬

鹽等肉其疾初如粟米或似麻子在肉裏而堅似炮長甚速初得多惡寒須臾即短氣取吳茱萸半斤作

末水一升和絞取汁頓服以滓傳上須臾服此汁令毒散止即不入腹也入腹即致禍矣切慎之凡痛病

喜發四肢其狀赤脈起如編繩急痛壯熱其發於足喜從臍起至踝亦如編繩故云痛病也發於臂喜者

腋之下皆由久勞熱氣盛為溼涼所折氣結筋中成此病也若不急治其久清膿亦令人筋攣縮也若不

消清其熱氣不散多作躄病漏蘆湯主之漏後鋒鍼數鍼去惡血氣鍼瀉其根核上傳小豆末取消為度

又用治丹法治之又用治癰三味甘草傳之癰疽門若潰傳膏散一如癰法惡核漏病癰疽等多起嶺表中

土野有南方人所食雜類繁多感病亦復不一仕人往彼深須預防之無法必遭其毒惟五香湯小豆

散即麻子小豆散凡附骨疽者以其無破外臺附骨成膿故名附骨疽喜者大節解

散見本草癰疽門吳茱萸皆其要藥中丈夫產婦喜著腔中小兒多著背背大人急著者先覺痛不得動搖按之應骨痛經日便覺皮肉漸急

洪腫如肥狀是也小兒繞手近便大呼即是肢節有痛候也大人緩著者先覺肌烘烘然經日便覺痛痺

洪腫如肥狀是也小兒繞手近便大呼即是肢節有痛候也大人緩著者先覺肌烘烘然經日便覺痛痺

不隨小兒四肢不能動搖亦如不隨狀者肢節解中若有崩烘烘處不知是附骨疽令遍身成腫不至潰
體皆有青黯大人亦有不別呼為賊風風腫不知是疽也凡人身體患熱當風取涼風入骨解中風熱相
搏便成附骨疽其候嗜眠沉重忽耳鳴又夏秋露卧為冷所折風熱伏結而作此疾急者熱多風少緩
者風多熱少小兒未知取風冷何故而有此疾由其血盛肌嫩為風折之即使凝結故也凡初得附骨疽
即服漏蘆湯下之傳小豆散得消可服五香連翹湯_{方見本卷}凡賊風其人體卒無熱中暴風冷即骨
解深痛不廢轉動按之應骨痛久即結痛或結癰癰其附骨疽久即腫而結膿以此為異若治附骨作賊
風則增益病深膿多若治賊風作附骨則加風冷遂成癰癰偏枯攣曲之疾也療之之效皆存善始耳此
非天下至精其孰能與於此若候附骨與賊風為異者附骨之始未腫但痛而已其賊風但痛不熱附骨
則其上壯熱四體乍寒乍熱小便亦大便澀而無汗若得下却熱并開發膝理便得消也縱不消盡亦得
浮淺近外凡賊風但夜痛骨不可按抑不得回轉痛處不壯熱亦不乍寒乍熱覺身體索索然冷欲得熱
慰痛處即小寬時復有汗出此為賊風證也宜鍼灸尉博服諸治風藥即愈_{方見第八卷}又有風熱毒
相搏為腫其狀先腫上生瘰癧如火灼處名曰風熱毒治之一如丹法 又有洪洪燭瘡身上忽生瘰癧
如沸湯灑劇者遍頭面亦有胸脇腰腹腫緩通體如火湯灼瘰癧起者是也治之法急服漏蘆湯下之外以
升麻膏傳之其傳升麻膏若無效一依傳丹方 凡熱瘡起便生白膿黃爛瘡起即淺但出黃汁名肥瘡
浸淫瘡者淺搔之蔓延長不止瘰癧者初如疥搔之轉生汁相連者是也 病瘡者初作亦如肥瘡喜
著手足常相對生隨月主死痛瘡坼裂春夏秋冬隨瘰癧劇者是也 有久癰餘瘡敗為深疽者在臍脘間
喜生瘡中水惡露寒凍不瘥經年成骨疽亦名肝瘡深爛青黑四邊堅強中央膿血汁出百約不瘥汁潰
好肉處皆虛腫亦有碎骨出者可溫赤龍皮湯漬_{方見卷二十三}夏月日日洗冬月四日一洗青肉多可傳
白蘭如散_{方見本卷}食去惡肉可三日一傳之止後長傳家猪屎散_{方見本卷}得瘥止取猪屎燒灰作末
加粉散瘡中令白汁出脫去隨而傳之瘥止若更青肉復者白蘭如散如前法家猪屎散取半復凡骨

疽百療不瘥者可瘡上以次灸之三日三夜便瘥如瘡不瘥瘥而復發骨從孔中出者名為骨疽取嫩長烏雌雞一隻去肉取骨熬焦如炭取三家牛楮木刮取屑三家鼈甲各一兩皆燒成灰合導瘡中碎骨當出數片瘥

治瘰癧秘方 射干 甘草 枳實 升麻 乾地黄 黃芩各八分 麝香二分 前胡三分 犀角六分 大黃十分

〔衍義〕

瘰癧毒根於裏從筋骨而發諸外雖用射干散腹中結氣不得大黃瀉滌腸胃則毒邪不得外泄又須犀角清解血中之毒則中外宣通其升麻前胡乃射干之佐枳實黃芩乃大黃之佐地黃甘草乃犀角之佐麝香一味通行經隊之宣使耳

治瘰癧者手足肩背累累如米起色白刮之汁出瘥後復發方 黃耆六分 升麻四分 款冬花二分 附子

苦參乾生 赤小豆各一分 右六味為末酒服方寸七稍加日三服

〔衍義〕

前方治毒邪方銳故用射干大黃外內合攻此方治瘰癧後餘邪故用升麻升發經氣則黃耆方得建內托之功款冬散結氣於中即前方中犀角地黃之意惟有苦參小豆解毒之味不得附子煖發之方何以遲寒熱兼濟逆從相需之妙當知餘毒之治與方張之治截然兩途故特立二方為式云

猪蹄湯 治瘰癧諸疽十指頭爛赤癢痛方 白芷 大黃 芫荽 黃芩 黃連 甘草 細辛 藜

本 當歸 菰蘆 莽草各一分 右十一味以水二斗先煮猪蹄一具取一斗煮藥取五浸瘡即

瘥○又方 竈屋塵 竈突塵 釜下土各一分 右三味合研令勻以水一斗煮三沸取汁洗日三四

度○又方 剝去瘡痂以溫醋泔清洗之以胡燕窠和百月男兒屎如膏傅之○又方 臘月糖晝夜

連浸數日乃愈

治瘰癧者手足肩背忽發累累如赤豆剝之汁出方 鯽魚一枚長三寸者 亂髮如雞子大 猪脂一斤 右三味煎為

膏傅之

治瘰癧浸淫多汁日漸大方 黃連二兩 胡粉 甘草 蘭茹各二分 右四味治下篩以粉瘡上日三四

度○又方 青木香 滑石 龍骨各三兩 胡粉 一兩 米粉 一升 石五味為末稍粉病上日三○又方

蕪菁子搗碎帛裹展轉傳上良○又方 麻子熟作末摩上良○又方 酒和麵傳之○又方 以猪膽傳之良

衍義 外治之方有浸洗有膏塗有粉傳總取解毒之用如猪蹄湯專取血肉之性以助諸藥之力

竈塵突裏金月下土取其散火 醋泔燕泥取其收溼 臘月飴糖取其止痛 鯽魚亂髮猪脂解毒

散血上皆未潰時治法 其下黃連胡粉甘草蘭茹與青木香滑石龍骨胡粉及蕪菁麻子酒麵猪膽等

治或取解毒收溼或取潤燥祛熱隨宜取用可也

又方 亂髮灰服方寸七日三亦治發背○又方 芸苔菜煮取汁一升服之并食乾熟芸苔數頃少與

鹽醬及月研子水和服之○又方 枸杞根并葵根葉煮汁煎令如錫隨意服之

衍義 髮灰散血 芸苔解毒 枸根去熱葵根利穀丹方之可取用者

治疽潰後方 以鹽湯洗拭了燒皂灰粉上良○又方 牛耳中垢傳之良○又方 梁上塵和車軋

中脂傳之○又方 生麻油滓綿裹布瘡上蟲出○又方 以沸湯灌瘡中三四遍湯一作錫

治疽似癰而小有異膿如小豆汁今日去明日滿者方 用芸苔熟搗溼布袋盛之埋熱灰中更互熨之

不過二三度安瘡及用乾者○又方 皂莢煎湯洗瘡拭乾以柏皮為末傳勿令作痴

治風疽方 凡癰腫及曲脈中瘰癧則 以青竹筒一枚徑一寸半長三尺中著大豆一升以糠馬屎二種

燒取火當竹筒中燒之以器承兩頭取汁先以泔清和鹽熱洗瘡了即塗豆汁不過三度極效○又方

嚼胡麻傳以繇裹之日易神良

治石疽狀如瘰癧而皮厚方 搗穀子傳之亦治金瘡

治久癰瘡敗壞成骨疽方 用龍骨末粉瘡四面厚二分以膏著瘡中日二易蟲出如髮盡愈膏方如左

大蝦蟆一以自亂髮子大猪脂一斤 右三味取二味內脂中煎略消盡下待冷更內鹽一合攪和

充前用

治瘡久不瘥而復發骨從孔中出名骨疽方 以猪膽和椒葉搗封之○又方 搗白楊葉末傳之○

又方 搗蕪菁子傳之常裹日一易○又方 穿地作坑口小裏大深三尺取乾雞屎二升以艾及荆葉搗碎和雞屎令可燃火坑中燒之令煙出內疽於坑中熏之以衣壅坑口勿泄氣半日當有蟲出甚效

治附骨疽方 榲皮燒為末飲服方寸匕○又方 新剝鼠皮如錢孔大貼腫上即膿出已潰者取猪脊

上脂貼之

治疽卒者五指筋急不得屈伸方 灸踝骨中央數十壯或至百壯

治久疽方 用鯽魚一枚破腹勿損內白鹽於腹中以鍼縫之入銅器中火上煎令乾作末傳疽瘡中無

膿者以猪脂和傅上小痛毋怪也十日瘥○又方 灸間使後一寸隨年壯立瘥

衍義

皂莢灰去死肌 牛耳垢除溼熱 梁塵車脂散火潤燥 麻油解毒引蟲 湯濯滌除熱垢

芸臺熱熨滑瘍拔毒外出 皂湯柏末滌垢收溼 竹筒豆汁善解風毒 胡麻噴傳專滋血燥

穀樹子軟堅和血 龍骨粉瘡收溼更須蝦蟆亂髮猪膏內入瘡中蟲出乃愈 膽汁椒葉解毒排

膿 白楊葉與椒葉同功 蕪菁解熱消腫 雞屎艾荆患疽不獨出蟲兼能透毒 榲皮化毒除蟲

并可服食 生鼠皮和血解毒 鯽魚末傳瘡中止血解毒血肉之性勝於草木也

苦匏散 治浸淫瘡方瘡表裏相當 苦匏一兩 蜂房 蛇蛻各半 大豆半合 梁上塵一合 右五味治

下篩以粉為粥和傅紙上貼之日三古今錄驗○又方 煎餅乘熱攤之亦治細癬○又方 猪牙車

骨年久者槌破燒令脂出熱塗之○又方 苦楝皮若枝燒作灰傅上乾者以猪脂和塗之并治小兒

禿瘡及諸惡瘡

〔行義〕金匱云浸淫瘡從口流向四肢者可治從四肢流來入口者不可治黃連粉主之千金用苦匏最亦取苦寒以解淫熱之邪佐以蜂房蟬蛻解毒殺蟲大豆梁塵瀉熱收淫通治上下浸淫也煎餅熱搗取麥入肝熱通血脈并引淫化之蟲外出猪牙骨入腎解毒利竅苦陳皮燒灰兼走肝脾專治淫化生蟲與金匱黃連粉異治同功按浸淫瘡俗名疔瘡從口流向四肢乃心脾淫熱故易治從四肢流來入口是腎肝淫毒故不易治非直不治也

治癰瘡方用醋一升溫令沸以生薤一把內中封瘡上瘡為度○又方搗桃葉和鯉魚酢糲封之亦可以酢傳上○又方炒臘月飴糖傳之○又方燒故履系為末傳之○又方燒松根取脂塗之

治燥癰方用醋和灰塗之○又方以熱牛屎塗之

治淫癰方燒乾蝦蟆和猪脂傳之

治癰疥百療不瘥方棟實一升桃皮苦參地榆各五兩右四味咬咀以水一斗煮取五升溫洗之日一度治久癰疥淫瘡浸淫日廣瘡不可堪搔之黃汁出

瘥後復發方用羊蹄根淨去土細切熟熬以醋和熟搗洗淨瘡傳上一時頃以冷水洗之日一度又陰乾作末瘥時搽則汁出以粉之又以生葱根搗之千金翼無葱字

治一切癰瘡凡脚腫及曲脈中瘡瘡則黃汁出是名風疽灸足大指間二七壯又灸大趾頭亦佳

治諸瘡因風致腫方燒白羊灰溫湯和厚三分傳瘡上乾即易五六度瘥○又方櫟根皮三十斤剉以水三斛煮令熱下鹽一把令的的然熱浸瘡當出膿血日日為之瘥止

治惡露瘡方搗薤葉傳瘡口以大艾炷灸約上令熱入內即瘥

治惡瘡方礬石松脂亂髮蠟各二兩猪膏四兩右五味煎髮候消內礬石次內松脂次內蠟去滓先刮洗瘡令淨然後用約塗之日二三不痛久瘥時愈新瘡遲愈腐疥瘡瘡頭禿者皆即愈生髮○又方燒扁竹灰和猪白汁塗之○又方羊屎麻根燒烟斷骨和封上有汁者乾傳之○又方以

麵一升作餅大小覆瘡灸上令熱汁出盡瘡

治惡瘡似火爛洗湯 用白馬屎曝乾以河水和煮十沸絞出汁洗之

治惡瘡其大如錢名曰馬疥瘡 以水漬自死蛇一頭令爛去骨以汁塗之隨瘡

治惡瘡十年不瘥似癩方 蛇蛻皮一具燒為末下篩豬脂和傅醋和亦得○又方 苦匏一枚碎煮汁

洗之日三度又煎以塗癬甚良當先以泔淨洗乃塗三日瘥○又方 燒瑕猪屎傅之○又方 鹽湯

洗搗地黃葉貼之○又方 燒良薑子為末傅之○又方 燒鯽魚灰和醬清傅之

烏膏 治惡瘡方 雄黃 雌黃 芎藭 升麻 烏頭 防己 竹灰 黃連 黃柏 水銀各二

胡粉 一分 蠟 三兩 杏仁 三十枚 巴豆 二十枚 松脂 亂髮各一雞 右十六味咬咀以脂膏三升急煎令髮

消去滓停小冷入真珠三錢七攪令相得以傅之凡用膏先淨洗瘡拭乾乃傅上傅訖以赤石脂黃連

散粉之翼方無竹灰水銀蠟

治種種諸瘡不愈者方 水銀 一兩 黃連 二兩 經墨 三分 右三味治下篩以不中水豬脂和傅上不過

二三度瘥神良若欲多作任人水銀大須熟研其藥惟不治金瘡

治反花瘡并治積年諸瘡方 取牛蒡根熟搗和臘月豬脂封上瘥止并治久不瘥諸腫惡瘡漏瘡等皆

瘥○又方 取馬齒莧搗封上瘥止○又方 取蜘蛛膜貼上數易之瘥止

治身瘡及頭瘡不止方 取菖蒲為末傅上日三夜二

治瘡久不瘥者方 無莢 黎蘆各一 薑黃 青礬 雄黃各一 苦參 沙參各三 附子 一枚 右八味

治下篩先以鹽汁洗瘡去垢乾拭傅上小兒一炊久剝去之大人半日纔剝再敷不過三四度愈

治諸瘡久不瘥并治六畜方 用東膏三升水六斗煮取一斗半數洗取愈

治代指方 用甘草二兩咬咀水五升煮取一升半漬之○又方 以唾和白礪砂先搜麵作碗子盛唾

次著礪砂如唾許以爪指著中一日瘥○又方 以毛雞黃土作泥泥指上厚五分許內糠灰中煨之

令熱可忍泥乾即易不過數度瘡○又方 刺指熱飯中二七通○又方 以麻沸湯之即愈○
又方 單煮地榆湯漬之半日○又方 取薑黃荻葉煮沸漬之○又方 以蜀椒四合水一升者三
沸漬之○又方 尖刺去膿血炙魚鱗皮令溫以纏裹周匝痛止便愈

治指痛欲脫方 猪脂和鹽煮令消熱內指中一食久佳異方和乾薑

治手足指掣痛不可忍方 用醬清和蜜溫塗之○又方 灸指端七壯立瘥

治手足指逆腫方比緣頭上極頭所致還在廁上以指倒將二七下即瘥○又方 真珠一分 乾薑二分 右二味
搗以粉瘡上日三

治手足皴裂逆腫代指方 酒溺猪脬洗之慎風冷

治冬月冒涉凍凌面目手足皴瘡及治熱痛欲瘥○又方 用麥窠煮令濃熱洗之

治凍指瘡欲墮方 用馬屎三升以水煮令沸清半日愈

治手足皴裂硬裂血出疼痛方 用猪脂者熱酒中洗之

治手足皴痛方 煮茄根洗之○又方 芎藭三分 蜀椒二分 白芷 防風 鹽各一分 右五味咬咀以

水四升煎取濃塗之或猪脂煎更良

治尸脚方凡人脚無冬夏常折裂者是用雞屎一升水二升煮數沸停小冷清半日瘥止亦用馬屎忌踏酒吐及婦

人穢血○又方 熔膠膠乾以故帛貼上

治割甲侵肉不瘥方 以礪砂礪石為末裹之以瘥為候○又方 搗鬼鍼草苗汁鼠粘草根和臘月猪

脂傅之

行義 癰瘡多生四肢委曲之中搔癢破流黃水與浸淫瘡總是濕熱所致觀千金諸治無非外傳等

法逮至手皮逆腫皴裂凍瘡微秒等證未遑殫述

行
高倉多生四肢委曲之中檢探成流香水與浸淫瘡爛是淫熱所致觀千金諸治無求外傳等

S9576
1915
V. 2 no. 21-22